



JOUST PRO®

Ώρα να χαλαρώσεις.

Νέα λύση ενάντια στους
μύκητες σιτηρών και ελαιοκράμβης.

- Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με **προληπτική, προστατευτική και θεραπευτική δράση** ενάντια στους κύριους μύκητες των σιτηρών και της ελαιοκράμβης.
- Έτοιμο ισορροπημένο μίγμα prothioconazole (15% β/ο) και azoxystrobin (15% β/ο) σε **φόρμουλα άριστης ποιότητας**.
- Σχεδιασμένο με την **ιδανική αναλογία συγκέντρωσης δραστικών ουσιών** για μέγιστη απόδοση φυτοπροστασίας στη σωστή δόση.
- Με πάνω από **800 πειράματα σε όλη την ΕΕ**, προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα σε σιτηρά και ελαιοκράμβη.

- ▶ Άριστος συνδυασμός δύο δραστικών με διαφορετικό και συμπληρωματικό τρόπο δράσης.
- ▶ Ευκολία στη χρήση.
- ▶ Ευρύ φάσμα δράσης.
- ▶ Ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής.



JOUST PRO®

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Στάδιο εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο /Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες.
		κ.εκ. σκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Χειμερινό Μαλακό και Σκληρό Σιτάρι, Χειμερινό Τριτικάλε	Σεπτορίωση, Καστανή Σκωρίαση, Κίτρινη Σκωρίαση, Ωίδιο	120-140	10-40	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	2/14-21 ημέρες
Χειμερινή Σίκαλη	Σεπτορίωση, Καστανή Σκωρίαση, Ωίδιο	120-140	10-40	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	2/14-21 ημέρες
Χειμερινό Κριθάρι	Ραμουλάρια, Σκωρίαση, Ωίδιο, Ρυγχοσπορίωση, Ελμινθοσπορίωση / Δικτυωτή κηλίδωση	100	10-40	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-61).	2/14-21 ημέρες
Χειμερινή Βρώμη	Σκωρίαση Φύλλων, Κηλίδα Φύλλων	100	10-40	Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης (BBCH 30-61).	2/14-21 ημέρες
Χειμερινή Ελαιοκράμβη	Σκληρωτίνια, Ωίδιο, Αλτενάρια	100-120	10-40	Μία εφαρμογή (φθινοπωρινή ή ανοιξιάτικη) Η φθινοπωρινή εφαρμογή από το στάδιο του 4ου φύλλου έως το 8ο φύλλο (BBCH 14-18). Ή Η ανοιξιάτικη εφαρμογή από το στάδιο της έναρξης επιμήκυνσης του πλάγιου βλαστού μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 20- 69).	1

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Παρατηρήσεις: 1. Η χρήση στο Σιτάρι περιλαμβάνει και τις χρήσεις σε Μονόκοκκο σιτάρι, Δίκοκκο σιτάρι, Σπέλτα και Tritordeum.

2. Να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας στην καλλιέργεια Tritordeum. Στην καλλιέργεια αυτή δεν έχει ελεγχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας από τη χρήση του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (PHI): Σιτηρά: 35 ημέρες, Ελαιοκράμβη: 56 ημέρες

JOUST PRO® SC	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	61202 / 20.05.2025
Δραστική ουσία	Prothioconazole 15% β/ο + Azoxystrobin 15% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Συμπυκνωμένο Εναώρημα (SC)
ΠΡΟΣΟΧΗ  	- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	



Καλλιεργούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr



K&N Efthymiadis



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025