

DIFFERENCE® 50 SC

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Fluometuron (φλουομετουρόν) 50%

Ζιζανιοκτόνο

Εγγυημένη σύνθεση:
Fluometuron: 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,70 % β/β

**ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ Ή
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ.**

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Υποπο για πρόκληση καρκίνου.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,

με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα. Ίλνεντε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής». «Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα». «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70138/9-11-2015

Κάτοχος της άδειας: **ΑΔΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**,
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231-Χαλάνδρι,
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Greenfarm Χημικά Α.Ε., Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ.: 210-6990932, e-mail: info@gr.nufarm.com
Παρασκευαστής σκευασμάτων:
ADAMA AGAN Ltd, Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

Διανομέας: **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ** 1217
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr



Περιεχόμενο: **10 λίτρα**



ΠΡΟΣΟΧΗ

DIFFERENCE® 50 SC

Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις (κ.ε.κ./στρ.)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος
Βαμβάκι	Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	240-400	30-60	Πριν τη σπορά, με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 5-8 εκ.	1
		300+100 H 200+200		Προφυτρωτικά. Εφόσον δεν ακολουθήσει βροχή, να ακολουθήσει άρδευση με 20-50 m3 νερό / στρέμμα.	1
		200		«Σπαστή» εφαρμογή προσπαρτικά, και προφυτρωτικά, με ενσωμάτωση	2
				Μετά το φύτεμα των βαμβακοφύτων και όταν αυτά έχουν ύψος 10 - 15 εκ., με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση τους	1

Κατάλογος καταπολεμώμενων ζιζανίων:

Προσπαρτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Αγριοβαμβάκι (*Abutilon thiofrasti*). **Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία: 300 κ.ε.κ. + 100 κ.ε.κ. ή 200 κ.ε.κ. + 200 κ.ε.κ.): Καλή αποτελεσματικότητα:** Αγριοβαμβάκι (*Abutilon thiofrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*).

Προφυτρωτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Λουβουδιές (*Chenopodium spp*), Αγριοβαμβάκι (*Abutilon thiofrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*).

Μεταφυτρωτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δοσολογίες. 2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες Ήρασις μετά την εφαρμογή. 3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή συνίσταται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.ε.κ./στρ. σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.ε.κ./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος. 4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευασματα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα δραστικότερα παρεμποδίζοντας τη φρασιμόνωση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιομορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακοφύτων, όταν αυτά έχουν ύψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μικρό τύπου σκούπας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενική συμβουλή: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ** ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Συμπτώματα:** Δυσκολία στην αναπνοή, αταξία, αδυναμία, υπνηλία. **Αντιδοτό/θεραπεία:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα αυτού σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόμενος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιδαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι. - **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλα καλλιεργήσιμα πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και βαθύ όργωμα. - **της πρόσδεσης του ανθρώπου των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνδυάζεται με θειοκαρβαμικά ζιζανιοκτόνα. Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Turphoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Sromp Aqua 455 CS, Energiser EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilrest 330 EC, Abilrest 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin). **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδεδειγμένα τον εξοπλισμό ψεκαστικό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκαστικό, την αντλία και τα μπεκ 2 με 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αέρος και τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται triplo έκπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασματος:** Αποθηκεύεται στο στην αρχική του παραρτηρήσιμη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0°C προστατευμένο από απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής: } Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας: }



1217