

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίησετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:**

•Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

•Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο, όταν χειρίζεστε το σκεύασμα».

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**

Για να αποφύγετε τους υδροβιόους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη **16 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα (για τα Πυρηνόκαρπα) και **14 μέτρων** (για τα Μηλοειδή).

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε άνω μέρος της φιάλης



**Dow** Dow AgroSciences



**Fenbuconazole**  
(χημική ομάδα τριαζολών)

Εγγυημένη σύνθεση: Fenbuconazole: 5 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 94,85 % β/β  
Περιέχει Pesticide 381  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)**

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση**



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Τοξικό για τους υδροβιόους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

Κάτοχος της άδειας: DOW AgroSciences Export S.A.S.  
6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus, 78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία.  
Παρασκευαστής: Dow AgroSciences LLC, Η.Π.Α.  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, Διανομή:

**K&N EARTH MATTERS**  
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος  
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr  
\*TM Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Αρ. Άδειας Διάθεσης  
στην Αγορά:  
60504/29-01-2016

Περιεχόμενο:  
**1 λίτρο**

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αγγαδιά, Αγγαδιά-Nashi, Κυδωνιά, Μουσαμουλιά (ήσσονος σημασίας):** Για Φουζικιάδιο (*Venturia inaequalis*; *V. pirina*), με δόση 65-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 100 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά:** Για Φαιά Σήψη (*Monilinia laxa*, *Monilinia fructicola*, *Monilinia fructigena*), **Όδιο** (*Sphaerotheca pannosa*, *Podosphaera glandeslana*, *Podosphaera litchdyctyla*), **Κυλινδροσπόριο Κερασιάς** (*Blumeriella jaapii*), **Σκυριασία** (*Tranzschelia discolor*, *Polystigma rubrum*), **Ανθράκωση** (*Gnomonia erythrostoma*), με δόση 100-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με το ξέδιπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες.

**Αμυγδαλιά:** Για Φαιά Σήψη (*Monilinia laxa*, *Monilinia fructicola*, *Monilinia fructigena*), με δόση 150-420 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 35-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την έκπτυξη των σφραλαμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**Φιστικιά (ήσσονος σημασίας):** Για Σειπόρια (*Septoria pistaciae*), **Σκυριασία** (*Pileolaria terebinthi*, *Pileolaria* sp.), **Βοτρυσσοφαρία** (*Camarosporium pistaciae*), με δόση 150-420 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 35-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την έκπτυξη των σφραλαμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες):** Για Όδιο (*Uncinula (Erysiphe) necator*) με μέγιστη δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 75 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 κ.εκ. και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες.

**Ελιά:** Για Κυκλοκόνιο (*Cycloconium oleaginum*), (*Spilocaea oleaginea*), με μέγιστη δόση 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

**Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκυθάκια (Y) & Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Y), Καρπούζι (Y):** Για Όδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Podosphaera fusca*, *Erysiphe Cichoracearum*, *Golovinomyces Cichoracearum*), με δόση 100-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 100 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση 3 πνευματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 3 εφαρμογές ανά 8 ημέρες.

**Παρατηρήσεις:**

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.
2. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας μουσαμουλιάς και φιστικιάς δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιεργίες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση το. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκαμού.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν αναμειγνύεται με αλκαλική αντίδραση σκευάσματα.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εραζώμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο ποκάμισο.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

- Μηλιά, Αγγαδιά, Αγγαδιά-Nashi, Κυδωνιά, Μουσαμουλιά, Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινολογικές ποικιλίες): **28 ημέρες**
- Αμυγδαλιά, Φιστικιά: **120 ημέρες**
- Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Y+Θ), Πεπόνι (Y), Καρπούζι (Y), Κολοκυθάκια (Y): **3 ημέρες**
- Κερασιά, Βυσσινιά: **5 ημέρες**.
- Ελιά: **Μη εφαρμοσμένο** (καθαρίζεται από το χρόνο εφαρμογής).



0619