

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΤΡΥΤΗ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ευρέως διαδεδομένος στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της τομάτας αυτή την περίοδο είναι ο μύκητας του βοτρυτή (*Botrytis cinerea*) ο οποίος κρίνεται επικίνδυνος λόγω της μεγάλης ταχύτητας με την οποία μεταφέρονται τα σπόρια του μύκητα από τους εξασθενημένους στους υγιείς ιστούς.

Οι μολύνσεις του μύκητα στην τομάτα γίνονται εμφανείς κυρίως από τους βλαστούς. Ο μύκητας προσβάλλει τα πράσινα μέρη της τομάτας δημιουργώντας τους ανοιχτόχρωμες κηλίδες, οι οποίες επεκτείνονται κατά μήκος του βλαστού ξεραίνοντάς τον. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του βοτρυτή εμφανίζεται επάνω στα προσβεβλημένα μέρη με την εξάνθιση γκρίζου χρώματος, γνωστό και ως «τεφρά σήψη». Η εξάνθιση αυτή δημιουργείται συνήθως λόγω της σχετικά υψηλής υγρασίας.

Γενικότερα τις μολύνσεις του μύκητα ευνοούν οι καλές θερμοκρασίες (15°-20°C) που επικρατούν στα θερμοκήπια, αλλά και η χαμηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε ασβέστιο.

Τα πρώτα βήματα για την αντιμετώπιση του μύκητα είναι ο αερισμός και η ρύθμιση της θερμοκρασίας, επιπλέον ο βοτρυτής μπορεί να αντιμετωπιστεί και χημικά με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Η K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ πρωτοπόρα στις νέες ιδέες και καινοτομίες στην Ελληνική αγορά προτείνει την χρήση για την αντιμετώπιση του παθογόνου το νέο εύκολο στην χρήση μυκητοκτόνο **SCOMRID AEROSOL**.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε [ΕΔΩ](#)