

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ



Ωιδιοκτόνα Αμπελιού



Λήθαργος Φούσκωμα Εμφάνιση φύλλων Μούρο Άνθηση Δέσιμο ραγών Πριν κλείσει το τσαμπί Γυάλισμα ράγας Πριν την ωρίμανση Ωρίμανση

ΩΙΔΙΟ: INDAR 5 EW, VEBUTANIL 24 EC, FERRANTO 50 WG, CYFLAMID 5EW

INDAR 5 EW

Δόση: 60/100 λίτρα νερό

Εφαρμογή: Πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

RHI: 28 ημέρες

VEBUTANIL 24 EC

Δόση: 8-12/100 λίτρα νερό

Εφαρμογή: Η βασική εφαρμογή γίνεται την άνοιξη όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 φύλλα και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.

RHI: 21 ημέρες

FERRANTO 50 WG

Δόση: 20 γρ/στρ

Εφαρμογή: Προληπτικοί ψεκασμοί, ξεκινώντας πριν από την άνθηση, με μεσοδιάστημα 12 ημερών

RHI: 35 ημέρες.

CYFLAMID 5EW

Δόση: 40-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού

Εφαρμογή: Προληπτική επέμβαση από την έναρξη της ανθοφορίας μέχρι την ανάπτυξη των ραγών

RHI: 21 ημέρες

Πρόγραμμα ψεκασμών ωιδίου του Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΩΙΔΙΟ



Λήθαργος Φούσκωμα Εμφάνιση φύλλων Μούρο Άνθηση Δέσιμο ραγών Πριν κλείσει το τσαμπί Γυάλισμα ράγας Πριν την ωρίμανση Ωρίμανση

CYFLAMID 5EW

FERRANTO 50 WG



INDAR 5EW

CYFLAMID 5EW

ΑΜΠΕΛΙ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

- Προϊόντα : ARISTON MZ 4/40WP, GETT MZ 5/60WG*, MILDEX WG


ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙ



KOCIDE 2000

DITHANE M-45

POLYRAM




GETT MZ

ARISTON MZ

MILDEX

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙ



 Κ.Α. Ευθυμιόπουλος & Ο.Ε.