

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

ENELSE 10 SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια): Για θρίπες στη δόση 560γρ./σρέμμα ή 700γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 λίτρα/σρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης (30-40% ανοικτά άνθη) φροντίζοντας να διαβραχει προσεκτικά και ιδιαίτερα η ζώνη των τσαμπιών *. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Για θρίπες στη δόση 550γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/σρέμμα. Εφαρμογή κατά την πώση πετάλων *. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΤΟΜΑΤΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (υπαιθρου-θερμοκηπίου): Για θρίπες στη δόση 550γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/σρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών με καλό λούσιμο των φυτών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΕΠΟΝΙΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ (υπαιθρου): Για θρίπες στη δόση 550γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/σρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών με καλό λούσιμο των φυτών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 21 μέρες *. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες.

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΙΑ, ΡΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΚΙΟΥ, ΚΙΧΩΡΙΟ, ΣΓΟΥΡΟ ΡΑΔΙΚΙ: Για θρίπες στη δόση 1100γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 550γρ./σρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/σρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (υπαιθρου-θερμοκηπίου): Για θρίπες στη δόση 550γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/σρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής με καλό λούσιμο των φυτών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Παρατήρηση:

*-Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

-Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.

ENELSE 10 SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα νερού. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνετε στο ψεκαστικό. Ξεπλένετε το δοχείο και ρίχνετε τα νερά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνετε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκισίμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Οι εργάτες να εισέρχονται στις καλλιέργειες που έχει γίνει εφαρμογή αφού στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Ιδιαίτερα για τα καλλωπιστικά φυτά, δεδομένου του υψηλού αριθμού ειδών και ποικιλιών που καλλιεργούνται, ακόμη και πρόσφατης εισαγωγής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε προκαταρκτικά στάδια σε μικρές επιφάνειες πριν να επεκτείνεται η χρήση σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (υπαιθρου): 3 ημέρες.

-Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαιθρου και θερμοκηπίου): 14 ημέρες.

-Αμπέλι, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια, Φυλλώδη Λαχανικά: Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

-Καλλωπιστικά: Δεν ορίζεται.

Ημερομηνία παρασκευής:
Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας



0215

ENELSE 10 SP

formetanate (ομάδα καρβαμιδικά)

Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Εγγυημένη σύνθεση: formetanate: 10% β/β
βοηθ. ουσίες 89,02% β/β

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιδραστεί σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιδραστεί σε περίπτωση εισπνοής.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει formetanate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14502/11-02-2015

Καθαρό βάρος: 1 κιλό

Κάτοχος της άδειας - παρασκευαστής:
Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada,
Rua Ivens no 3-b, D. Mecia Building, 6th floor 9000-046 Funchal-Madeira, Πορτογαλία.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

K.N. Ευθυμιάδης οβσε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέστε εμετό. Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του φέρτε τον σε μια σταθερή θέση για μεταφορά. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε ανίσθητα άτομα.

Αντιδοτό: Το συνιστώμενο αντιδοτό είναι θειική ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μη χρησιμοποιείτε 2-PAM. Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

*Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. *Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. *Αποφεύγετε να αναπνεύετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. *Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα, προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή και εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό*. *Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

***Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθροπόδα να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους **5 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσεις μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες εφαρμόστε το προϊόν τις απογευματινές ώρες όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.