

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφίστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να μην προκληθεί εμετός. Να γίνει πλύση στομάχου με 4 λίτρα νερού και μετά να χορηγηθεί ζωικός άνθρακας και θεϊκό νάτριο. Περαιτέρω συμπτωματική θεραπεία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Επικοινωνήστε με γιατρό αν χρειαστεί.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και επικοινωνήστε με γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των κενών μέσων συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλύματος τα ρίχνουμε το ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε στο άνω μέρος της φιάλης
Αριθμός Παρτίδας:

KENDO 5,34SC

fenpyroximate (φενπυροξιμίτ) 5,34%

Συμπυκνωμένο αιώρημα

Εγγυημένη σύνθεση: fenpyroximate 5,34% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 94,53% β/β

**Μη διασυστηματικό ακαρεοκτόνο
που δρα δια επαφής και από στομάχου
σε όλα τα στάδια των ακάρεων**



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ**

Αριθμ.Εγκρ. Κυκλοφορίας: 2063/ 23-7-1993

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΣ: ΝΙΧΟΝ ΝΟΗΥΑΚΥ Co, Ιαπωνίας
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Κ.Θ. Ευθυμιόδη οβεε

ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ.2310 568656 • FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μηλιές: Κόκκινος τετράνυχος (*Panonychus ulmi*).

Εσπεριδοειδή: Τετράνυχος εσπεριδοειδών (*Panonychus citri*).

ΔΟΣΗ: 75-100 κ.εκ./100 λίτρα νερού.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η χαμηλή δόση χρησιμοποιείται όταν: α) η εκκόλαψη των αυγών έχει συντελεστεί τουλάχιστον κατά 80%, β) ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τις 20 κινητές μορφές ανά φύλλο.
- 2) Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν: τα αυγά που έχουν εκκολληθεί είναι πολύ λίγα ή οι κινητές μορφές/φύλλο είναι πάνω από 20 άτομα.

Περιορισμοί κατά τη χρήση:

Να μη χρησιμοποιούνται κατά την ίδια καλλιεργητική περίοδο δυο ή περισσότερα από τα σκευάσματα KENDO SC, MASAI 20 WP, PRIDE 20 SC και NEXTER 20 EC για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ακάρεων.

Να μην εφαρμόζεται περισσότερο από μια (1) φορά σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Να μη συνδυάζεται με βορδινάλιο πολύ και γενικά χαλκούχα σκευάσματα και με θειασβέστιο. Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα σκευάσματα να προηγείται πάντα δοκιμή σε μικρή κλίμακα. Δε συνιστάται η ανάμιξή του με περισσότερα του ενός σκευάσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα KENDO ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας το ανακάτεμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιές: 7 ημέρες.

Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες.



0715