

395 mm



ethoprophos - εθοπροφώς

Κοκκώδες (GR)

Οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο - εντομοκτόνο με δράση επαφής

Τρόπος εφαρμογής: Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή επί της γραμμής σποράς και ενσωμάτωση.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυαμα: Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής για τουλάχιστον 14 ημέρες.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστάμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσης.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
 Καθορίζεται με το στάδιο της καλλιέργειας κατά το χρόνο της εφαρμογής και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ο καθορισμός σε ημέρες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην αναπνέετε σκόνη • Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια πρόσωπο. • Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από σκόνη:
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Πληροφορίες για τον γιατρό: το προϊόν περιέχει έναν αναστολέα της χολινηστεράσης - οργανοφωσφορικό παρασποκτόνο. Επικίνδυνες ποσότητες μπορούν να απορροφηθούν από το δέρμα.

Συμπτώματα: Συμπτώματα αναστολής της χολινηστεράσης (γαστροεντερικές διαταραχές, δύσπνοια, συστολή των αναπνευστικών οδών, βραδυκαρδία, συστολή κόρης, νευρική σπασμοί).

Θεραπεία: Παρακολούθηση του αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνιστάται ενδοτραχειακή διασωλήνωση και πλήρη στομάχι, ακολουθούμενα από χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο μπορεί να χρειαστούν. Αποβολή με διάλυμα (εξανακαμμένη αλκαλική διαίρεση). Παρακολούθηση: ερυθρά αιμοσφαίρια και χολινηστεράση στο πλάσμα. Για την αντιμετώπιση σπασμών χορηγήστε diazepam σε ενήλικες 5-10 mg ενδοφλέβιως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ηρέμια - σε παιδιά 2,5 mg ενδοφλέβιως.

Αντιδότο: Υψηλή δόση ατροπίνης (1-4 mg για ενήλικες) επαναλαμβανόμενη όπως απαιτείται και αν είναι δυνατόν σε συνδυασμό με Contrathion (Pralidoxime) 1 gr ενδοφλέβιως για ενήλικες με επανάληψη μετά από 10-12 ώρες.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πολύ τοξικό για τον υδρόβιο οργανισμό, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος.
 Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.
 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες (σασκούλες, σάκοι), αφού καταστραφούν με σκόμιο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του αραβαστία συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

262,5

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόση (κιλά σκευάσματος / στρ.) *	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Καπός	Έντομα εδάφους: Σχιδροσκάλιες (Agrotis lineatus) Κοπρσοκάλινα (Agrotis spp) Προστέγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)	2,5 - 3 1,5 - 1,8	Κατά τη μεταρτίωση. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση. Κατά τη μεταρτίωση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Νηματούδες	4,2 - 5,4	Κατά τη μεταρτίωση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Καλαμπίκι	2,5 - 3 1,5 - 1,8	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση. Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
Πατάτα	Έντομα εδάφους: Σχιδροσκάλιες (Agrotis lineatus) Κοπρσοκάλινα (Agrotis spp) Προστέγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)	2,5 - 3 1,5 - 1,8	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση. Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Νηματούδες	4,8	Κατά τη μεταρτίωση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Αραχίδα	Νηματούδες	4,2 - 5,4
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σχιδροσκάλιες (Agrotis lineatus) Κοπρσοκάλινα (Agrotis spp) Προστέγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)	2,5 - 3 1,5 - 1,8	Κατά τη μεταρτίωση. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση. Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Νηματούδες	4,2 - 4,8	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σχιδροσκάλιες (Agrotis lineatus) Κοπρσοκάλινα (Agrotis spp) Προστέγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)	2,5 - 3 1,5 - 1,8
Φασόλι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σχιδροσκάλιες (Agrotis lineatus) Κοπρσοκάλινα (Agrotis spp) Προστέγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)	2,5 - 3 1,5 - 1,8	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση. Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Νηματούδες	5 - 6 3 - 3,6	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση. Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.
	Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Αγκινάρα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Λάχανο (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Καυτεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Κρεμμύδι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σχιδροσκάλιες (Agrotis lineatus) Κοπρσοκάλινα (Agrotis spp) Προστέγγουρας (Gryllotalpa gryllotalpa)	2,5 - 3 1,5 - 1,8
Σκόρδο	Νηματούδες	6	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια.
Ανθοκομία		2,5 - 3	Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.
		1,5 - 1,8	Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.

Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις καλλιέργειες 1

Παρατηρήσεις:
 - Επιτρέπεται μόνο μια (1) εφαρμογή ανά καλλιέργεια ανά έτος.
 - * Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.

- PANT RED 032 CVU
- PANT ORANG 021 CVU
- PANT BLUE 2728 CVU
- PANT GREEN 349 CVU
- BLACK

225



ethoprophos - εθοπροφώς

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη σύνθεση: ethoprophos 10,53% β/β βοηθητικές ουσίες 82,47% β/β

Οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο - εντομοκτόνο με δράση επαφής



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Επιβαλλές σε περίπτωση κατάποσης.
- Σθανηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Σθανηφόρο σε επαφή με το δέρμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντηλησης) αβαθή νερά.

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 3018/ 5-10-1983

Καθ. βάρος 15 κιλά

Κάτοχος της έγκρισης: **AMVAC**
 AMVAC C.V. NETHERLAND, Kokermolen 5, 3994 DG Houten, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:



ΒΙ. ΠΕ. Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

275

UN 2783
 ORGANOPHOSPHORUS
 PESTICIDE, SOLID,
 TOXIC
 (ETHOPROPHOS MIXTURE)



0314

030558171L

384 mm

212,5

1089 mm