

20 SG
Profil

Profil 20 SG

Το **Profil 20 SG** είναι εντομοκτόνο της ομάδας των **νεονικονοειδών**. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις και ορισμένα Λεπιδόπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (*Phyllocnistis citri*). Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικονινοικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Φυτώρια Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά): Για αφίδες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Για φυλλοκνίστη με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί κυρίως στην νέα βλάστηση το καλοκαίρι με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κιτριά): Για αφίδες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί με την έναρξη της προσβολής νωρίς την άνοιξη κατά την περίοδο από τη διάγκωση των σφραλαμών έως την πτώση των πετάλων - όγκος ψεκαστικού υγρού 200 λίτρα / στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για αφίδες, φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κεράσια, Δαμασκηλιά): Για αφίδες, φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού για πυρηνόκαρπα 100-150 για δαμασκηνιές 100 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 35-40 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού στον αγρό 50-100, στο θερμοκήπιο 100-170 λίτρα / στρέμμα.

Μαρούλι (υπαίθρου-θερμοκηπίου): Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Πεπόνι υπαίθρου: Για αφίδες με 12,5-15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 20-25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-60 λίτρα / στρέμμα.

Αγγούρι θερμοκηπίου: Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 35-40 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι: Για αφίδες με 20-25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις με 25-30 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα / στρέμμα.

Καπνός: Για αφίδες και αλευρώδεις με 25-30 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα: Για δορυφόρο με 12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αφίδες με 20 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα / στρέμμα.

Μηδική: Για αφίδες με 7,5-10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα / στρέμμα.

Καλλωπιστικά: Για αφίδες με 25 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Για αλευρώδεις και δευτερεύουσα δράση κατά του θρίπτα με 35-40 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής - όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

- Εσπεριδοειδή: 1
- Φυτώρια Εσπεριδοειδών και όλες οι άλλες καλλιεργείες: 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2. Η διάρκεια δράσης του Profil 20 SG είναι 14-21 ημέρες.
3. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιεργεία και το στάδιο ανάπτυξης της.

Profil 20 SG

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

- Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο.
- Να αποφεύγεται η χρήση του PROFIL 20 SG σε καλλιεργείες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικονοειδή σκευάσματα καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά.
- Να γίνεται εναλλαγή του PROFIL 20 SG με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα νεονικονοειδή.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των ωφέλιμων αρθρόποδων:

- Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του PROFIL 20 SG, η εξαπόλυση βομβινών (για επικοινωνία των ανθέων) ή/και αρπακτικών ακάρεων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φύλλων.
- Η εξαπόλυση των υμενόπτερων παρασιτοειδών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 βδομάδες μετά την εφαρμογή του PROFIL 20 SG.
- Η εξαπόλυση του αρπακτικού Όπιθ θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7 βδομάδες μετά την εφαρμογή του PROFIL 20 SG.
- Επιβάλλεται η διατήρηση αφέκαστης ζώνης δέντρων εσπεριδοειδών σε ποσοστό 5% για τη προστασία του ωφέλιμου εντόμου **Cales noaki**.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
- Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μικρή ποσότητα νερού.
- Ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών καλλωπιστικών φυτών συνιστάται πριν τον ψεκασμό της καλλιεργείας να γίνει δοκιμή σε μικρή έκταση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πορτοκαλία, Μανταρινιά, Λεμόνια, Μηλα, Αχλαδιά, Ροδακίνα, Νεκταρινία, Βερικοκιά, Κεράσια, Δαμασκηλιά, Βαμβάκι, Καπνός, Μηδική: **14 ημέρες**.
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες: **7 ημέρες (υπαίθρου)**, **3 ημέρες (θερμοκηπίου)**.
Μαρούλια (υπαίθρου-θερμοκηπίου), Πατάτες, Πεπόνι αγρού: **7 ημέρες**.
Αγγούρι θερμοκηπίου: **3 ημέρες**.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στο άνω μέρος του κουτιού
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Profil 20 SG

acetamiprid (ασεταμπρίντ)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι

Εγγυημένη σύνθεση:

Acetamiprid 20% β/β

Βοηθητικές ουσίες 79,85% β/β

Διασυστηματικό Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Εγκ. Κυκλοφορίας: 14139/22-6-2006

Καθαρό βάρος: 300 γρ.

Κάτοχος της έγκρισης:
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH,
Berliner Allee 42, 402012 Düsseldorf, Γερμανία
Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας:

Kyl Ενδυμιάδη οβεε

ΒΙ. ΠΕ. Θ. ΣΙΝΔΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• ΤΗΛ. 2310 568656 • FAX: 2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

Profil 20 SG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Ξεπλύνετε το στόμα. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας να ξεπλυθείτε καλά, με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι με νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

