



Florasulam 5%
(χημική ομάδα: Τριαζολοπυριμιδινών-σουλφανιδίων)

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστικές ουσίες: Florasulam: 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 95,07 % β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
- Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Συστήνεται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό του σκευάσματος.

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70105 / 11-02-2015

Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co. KG, 25 St.-Peter-Strasse, A-4021 Linz, Αυστρία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Greenfarm Χημικά Α.Ε., Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή, Τηλ.: 210 6990932, E-mail: info@gr.nufarm.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

Περιεχόμενο:
5 λίτρα e



Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 40, 570 22, Σινδος
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών. Το Florasulam δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου οξειγαλακτικής συνθέτασης (acetolactate synthase-ALS).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Χειμερινό & Ανοιξιάτικο Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι: Ένας μεταφυτρωτικός ψεκασμός από το 2^ο φύλλο της καλλιέργειας και μέχρι ο δεύτερος κόμβος να είναι 2 εκατοστά από τον 1^ο, για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 25-75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15 κ.εκ. σκευάσιμ./στρ.) και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Χειμερινή Σίκαλη, Triticale: Ένας μεταφυτρωτικός ψεκασμός από το 2^ο φύλλο της καλλιέργειας μέχρι το 3^ο αδελφί για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια με δόση 25-75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10-15 κ.εκ. σκευάσιμ./στρ.) και όγκο ψεκαστικού υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-Ευαίσθητα ζιζάνια: Κολλητσίδα (*Galium aparine*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Χαμομήλι (*Matricaria camomilla*), Ανθέμις (*Anthemis arvensis*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Καψέλα (*Capsella bursa pastoris*), Αγρία ρόκα (*Diploctaxis erucoides*), Σινάπι (*Sinapis arvensis*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Μπιφόρα (*Bifora radians*), Αγριοβίκος (*Vicia sativa*).

-Να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια είναι σε νεαρό στάδιο (4-6 φύλλα) και στην περίπτωση της Κολλητσίδας όταν αυτή είναι κάτω από 20 εκ.

- Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό stress λόγω κρούς ή ξηρασίας ή έλλειψης λίπανσης κλπ.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm. με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μικρό τύπου σκούπας. Η εφαρμογή να είναι ομοιόμορφη και να αποφεύγεται η επικάλυψη.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα ¾ με νερό. Ανακινείστε καλά τη φιάλη συσκευασίας και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Στην περίπτωση που αδειάζει η φιάλη, τότε ξεπλύνετε τρεις φορές και ρίξτε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Η δόση εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και την πυκνότητα των ζιζανίων. Εφαρμόστε εναλλακτικές μεθόδους έλεγχου των ζιζανίων (μηχανικές καλλιεργητικές κλπ.) όπου είναι δυνατόν και εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρούν αμέσως σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, αραβόσιτος και σίκαλη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν έχει εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμένει.

Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν υπάρχει.

Κατάποση: δεν συνιστάται πρόκληση εμετού. Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε νερό ή γάλα. Αν προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Αναπνοή: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια αν η αδιαθεσία παραμένει.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία με βάση τη γενική κλινική κατάσταση. Πλύση στομάχου ή/και λήψη ενεργού άνθρακα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί τα σταγονίδια του ψεκασμού να μεταφερθούν σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Triticale: Δεν εφαρμόζεται.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τα στάδια καθαρισμού που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

- Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αύλο) και αδειάστε το ξανά.

- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά εκατόλιτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος 'ψεκάροντας' υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μια φορά και ακόμη μια φορά χωρίς αμμωνία.

- Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξεπλύμα δύο φορές των φίλτρων και των μπεκ.

Οδηγίες για την ασφάλειά απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως τα δοχεία με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του αραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30°C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

1218

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βλέπε φιάλη
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

