

ΤΕΡΡΕΚΙ 50 WG

flocicamid
(χημική ομάδα πυριδινοκαρβοξαμιδίων)

ENTOMOKTONO

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Flocicamid 50% β/β
Βοηθ. ουσίες 47,92% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πρακτικά σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Περιέχει Disodium maleate.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **500 γρ.**

Κάτοχος της άδειας, παρασκευαστής σκευάσματος:

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.,
Pegasus Park, De Kleeflaan 12, Box 9 1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομείς:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ. Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ.Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14511 / 25-5-2015



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΞΙΠΕΡΙΔΟΞΙΔΗ: Πορτοκάλια, Μανταρινιές, Λεμονιές, Γκρέιπ – φρούτ, Κίτρα, Φράπες, Νεραντζιές, Περγαμόνο, Κοκκιλάκι. Για αφίδες **εσπεριδοειδών** (*Aphis citricola*, *Toxoptera auranti*, *Aphis gossypii*, *Myzus persicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 10γρ./στρέμμα ή 3,5-10γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιές, Νεκταρινιές. Για αφίδες (*Myzus persicae*, *Hyaloperis pruni*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzii*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Κερασιές: Για αφίδες (*Myzus cerasi*, *Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzii*, *Hyaloperis pruni*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Δαμασκητιάς: Για αφίδες (*Hyaloperis pruni*, *Myzus persicae*, *Brachycaudus helichrysi*, *Brachycaudus schwartzii*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

ΜΗΛΙΕΣ: Για **γκρίζα αφίδα** (*Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*, *Eriosoma lanigerum*) και για **πράσινη αφίδα** (*Aphis pomi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

ΑΧΛΑΔΙΕΣ, ΚΥΛΩΝΙΕΣ, ΝΑΣΗ: Για αφίδες, **γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς** (*Dysaphis pyri*, *Eriosoma lanigerum*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

ΣΟΛΑΝΟΪΔΕΣ: Τομάτες, **Μελιτζάνες (αγρού):** Για αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum spr.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου): Για αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum spr.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 Φυλλώματος, 2 Με στάγην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου) (για εφαρμογές με στάγην άρδευση): Για **Αλευράειδες** (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*). Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα, ενάντια στις αφίδες. Σ' αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγην άρδευση και μία φυλλώματος. Δόση: 16γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 max (1 Φυλλώματος, 2 Με στάγην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 μέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 200-500 λίτρα/στρέμμα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια (θερμοκηπίου): Για αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Macrosiphum spr.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

ΠΑΤΑΤΕΣ: Για αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis nasturtii*, *Aphis frangulae*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Aulacorthum solani*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 16γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα.

ΣΙΤΑΡ: Για αφίδες (*Aphis nasturtii*, *Macrosiphum avenae*, *Macrosiphum dirhodum*, *Metopolophium dirhodum*, *Rhopalosiphum padi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα.

ΚΑΠΝΟΣ: Για αφίδες (*Myzus spr.*) και για **Θρίπες** (*Thrips tabaci*) (Χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1). Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.

ΚΑΠΝΟΣ: (εφαρμογή με ριζοτόπια με τον όρο «επιπτώσεις»²⁾). Για **Αφίδες** (*Myzus nicotianae*, *Myzus spr.*, *Aphis sp.*) και για **Θρίπες** (*Thrips tabaci*) (Χρήση ήσσονος σημασίας). Εφαρμογή κατά τη μεταρύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14 γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 max (1 εφαρμογή με ριζοτόπια με το νερό της μεταρύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος) με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για αφίδες (*Aphis gossypii*) και για **Λύγκο** (*Lygus sp.*)³⁾. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 7,5γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.

ΑΡΑΚΑΣ (με λοβό) υπαίθρου: Για αφίδες (*Myzus persicae*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6^{ης} ζεφυλιμένου φύλλου χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 35-70 γρ./100 λίτρα φεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.

ΚΑΛΩΠΙΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ (αγρού και θερμοκηπίου): Για αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum spr.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών εντόμων¹⁾. Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

ΚΑΛΩΠΙΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ: Για αφίδες (*Aphis gossypii*, *Myzus persicae*, *Macrosiphum spr.*, *Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών¹⁾. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος φεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περιόδους με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διασπορά των φυτών.
- 4) Για τις χρήσεις πρόσονος σημασίας: Βαμβάκι και Καπνός, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για την χρήση του σκευάσματος σε αυτές τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.
- 5) Για τη χρήση πρόσονος σημασίας: Αρακάς (με λοβό) δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φωτοσκόνη από τη χρήση του.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμοι καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναλόγως. Προσθέτουμε το υπολείπο που συνεχίζονται την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Ξεπλάμω με άφθονο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Εξαιρέστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλάμω το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίηση ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτοκτινής ή περιβαλλοντολογικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: -Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των υφελώνων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. -Επεμβάσεις με ΤΕΡΡΕΚΙ χωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα. -Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιάστημα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται αδιάφορη κλίση της φυλλικής επιφάνειας. -Να αποφευχθούν οι διαδοχικές εφαρμογές με ΤΕΡΡΕΚΙ. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε ενολογημένα με εντομοκίνα άλλων χημικών ουσιών που δεν εμφανίζουν διασυστηματική ανθεκτικότητα με το flocicamid. - Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μελισσές δεν είναι ενεργές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

Στοιχεία φωτοσκόνητας: Δεν είναι φωτοσκόνητας στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 60 ημέρες. Μηλιές, Αχλαδιές, Κυδωνιές, Νάση: 21 ημέρες. Ροδακινιές, Νεκταρινιές, Δαμασκητιάς, Κερασιές, Πατάτες, Αρακάς (με λοβό): 14 ημέρες. Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια (θερμοκηπίου), Τομάτες, Μελιτζάνες (αγρού και θερμοκηπίου): 1 ημέρα. Καπνός: 7 ημέρες. Σίταρο: 28 ημέρες. Βαμβάκι: 75 ημέρες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσετε κλειδωμένο. •Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Πλύνετε τα χέρια, βραχιόνες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το αέριση. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα/μέσα προστασίας για τα μάτια/προσώπο. •Αδιστάθην την παρεμπόδιση/πρόσφυση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. •Φοράτε πάντα ολοσύνωτη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προστασίας κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φορτώσεως. •Φοράτε ολοσύνωτη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. •Φοράτε γάντια και ολοσύνωτη προστατευτική ενδυμασία εάν εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ ή κωμίνη. •Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προστασίας εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ ή κωμίνη. •Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προστασίας και ολοσύνωτη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό. •Φοράτε ολοσύνωτη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού. •Σε περίπτωση επεισοδίου στην καλλιέργεια φοράτε ολοσύνωτη προστατευτική ενδυμασία.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις Αδιστάθμιστες επιφανείες και τους δρόμους.)
Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμείκταστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρούσας μελισσών.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΛΟΓΟ:

Σε περίπτωση κατάστασης: Σητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τη συνείδησή του.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχει οφθαλμική ερυθρότητα, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες υπάρχει σκεύασμα ή ψεκαστικό νερό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό νερό. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
Αντιβίο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιβίο. Ακολουθήστε συστημικά συμπτώματα.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 773 9377

ΟΝΗΓΕΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται από πίσω ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταπορώσονται προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναιωπιούνται όλα σε ημερήσια συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στο
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: άνω μέρος της συσκευασίας.