

Πρόταση
Ζιζανιοκτονίας Καθαμποκιού
από την **K&N Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ**



K&NE
EARTH MATTERS

SULCOGAN® 30 SC

ΑΑΔΑ: 7859/22-04-2008

KIDEKA® 100 SC

70226/25-07-2017


SAMSON® EXTRA 6 OD

ΑΑΔΑ: 70012/21-01-2013

Η σταθερή αξία!

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος με βάση το **sulcotrione (30% β/ο)** για την **καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων** στο **καλαμπόκι**. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τις ρίζες.

Τα **SULCOGAN®** και **KIDEKA®** ανήκουν στη χημική ομάδα των τρικετονών και δρουν **παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών**, συντελώντας στη **φωτοδιάσπαση της χλωροφύλλης**. Η **λεύκανση** στο φύλλωμα και στα αναπτυσσόμενα μέρη των ευπαθών ζιζανίων εμφανίζεται σε **διάστημα 7-10 ημερών μετά την εφαρμογή**, ενώ η **νέκρωση των ζιζανίων** επέρχεται σε **διάστημα 2-3 εβδομάδων**. Ωστόσο, τα ζιζάνια παύουν να ανταγωνίζονται την καλλιέργεια **αμέσως μετά την εφαρμογή**.



Γρήγορη δράση ορατή σε λίγες μέρες!

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το **mesotrione (10% β/ο)** για τον **έλεγχο των πιο δύσκολων ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων** και με καλή δράση σε κάποια αγρωστώδη (**μουχρίτσα**) στο καλαμπόκι.

Απορροφάται ταχέως κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τις ρίζες των ζιζανίων και μεταφέρεται γρήγορα στα αναπτυσσόμενα μέρη μέσω των ηθμωδών και ξυλωδών αγγείων.

Νέα τεχνολογία προς όφελος του παραγωγού!

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το **nicosulfuron (6% β/ο)**, για την καταπολέμηση **αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων** στο καλαμπόκι. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS (οξικογαλακτική συνθετάση), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση σημαντικών αμινοξέων στα φυτά.

Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας, αναστέλλοντας την αύξηση, προκαλώντας τον ερυθρό μεταχρωματισμό των ζιζανίων, την παραμόρφωση του φυλλώματος και τελικά την ξήρασή τους.

Είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της ISK Biosciences και **ενσωματώνει νέα τεχνολογία** με την **προσθήκη ειδικών βοηθητικών ουσιών**, προσδίδοντας στο **σκεύασμα βελτιωμένη σύνθεση** για:

- την καλύτερη διαβροχή του φυλλώματος
- την ταχύτερη είσοδο στο ζιζάνιο
- τη μείωση της εξάτμισης του σκευάσματος
- τη γρηγορότερη εκδήλωση της ζιζανιοκτόνου δράσης

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

	ZIZANIA-ΣΤΟΧΟΙ	SULCOGAN® 30 SC	KIDEKA® 100 SC	SAMSON® EXTRA 6 OD
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ	Αγριοβαμβάκια			
	Αγριομελιτζάνα			
	Αγριοντοματιά			
	Αγριοπιπεριά			
	Αναρριχώμενο πολύγωνο			
	Anagallis arvensis			
	Βερόνικα			
	Βλήτα			
	Ζωχός			
	Λαπάτσα			
	Λουβουδιά			
	Μαρτιάκος			
	Σκαρολάχανο			
	Στελλήαρια			
Τάτουλας				
Τραχύ βλήτο				
ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ	Αιματόχορτο			
	Βέλιουρας			
	Μουχρίτσα			
	Σετάριας			

ΕΛΑΙΟ: Είναι ένα βιοδιασπώμενο λάδι

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: Επικαλύπτει τη δραστική ουσία, ώστε να εξασφαλίσει τη διαλυσιμότητά της, τόσο μέσα στο νερό, όσο και μέσα στο έλαιο.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΥΣΙΑ: Αποτελεί τον ενεργοποιητή της δεισδύσης στα φύλλα.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ: Είναι επικρανειοδραστικά, με ιδιότητες λιπόφιλης και υδρόφιλης ιδιότητες.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 6% β/ο

93,4% β/β

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ






SULCOGAN® 30 SC	100-150 κ.εκ./στρ. (πλατύφυλλα) (1) 150 κ.εκ./στρ. (αγρωστώδη) Από τα 2-3 φύλλα ως τα 7-8 φύλλα
KIDEKA® 100 SC	100-150 κ.εκ./στρ. ή 2 εφαρμογές: α) 75 κ.εκ./στρ. και β) 75 κ.εκ./στρ. Από τα 2 ως τα 8 φύλλα (2)
SAMSON® EXTRA 6 OD	75 κ.εκ./στρ. ή 2 εφαρμογές: α) 50 κ.εκ./στρ. και β) 25 κ.εκ./στρ. με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών στην περίπτωση σταδιακής εμφάνισης των ζιζανίων. Από τα 2 ως τα 8 φύλλα (3)

- Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. (SULCOGAN® 30 SC, SAMSON® EXTRA 6 OD), 15-50 λίτρα/στρ. (KIDEKA® 100 SC)**
- (1) Η δοσολογία των 100 κ.εκ./στρ. εφαρμόζεται όταν έχουμε μικρά πλατύφυλλα (2-4 φύλλα), ενώ η δοσολογία των 150 κ.εκ./στρ. όταν ο μέγιστος αριθμός των πλατύφυλλων ζιζανίων βρίσκεται περί το 4^ο φύλλο ή/και παρουσία αγρωστωδών.
 - (2) Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων να γίνεται από το φύτεμα τους έως και το 4^ο φύλλο, ενώ για τον έλεγχο των αγρωστωδών ζιζανίων σε νεαρό στάδιο (1^ο - 3^ο φύλλο).
 - (3) Να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 φύλλων ως το αδελφωμα (μουχρίτσα, σετάριας), των 2 με 6 φύλλων ως το αδελφωμα (βέλιουρας) και των 2 ως 6 φύλλων (πλατύφυλλα).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

<p>SULCOGAN® 30 SC</p> <p>Δραστική ουσία: Sulcotrione 30% β/ο</p> <p>(Συμπυκνωμένο Εναιώρημα-SC)</p>	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβριο. - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Περιέχει Sulcotrione και 1,2-Benzisothiazolin-3-one, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
<p>KIDEKA® 100 SC</p> <p>Δραστική ουσία: Mesotrione 10% β/ο</p> <p>(Συμπυκνωμένο Εναιώρημα-SC)</p>	<p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
<p>SAMSON® EXTRA 6 OD</p> <p>Δραστική ουσία: Nicosulfuron 6% β/ο</p> <p>(Ελαιώδες Εναιώρημα-OD)</p>	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Κάτοχος της άδειας:

SULCOGAN® 30 SC: Nufarm GmbH & Co. KG

KIDEKA® 100 SC: Nufarm S.A.S.

SAMSON® EXTRA 6 OD: ISK Biosciences Europe N.V.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, Φαξ, 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ, 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr



www.efthymiadis.gr

