

Proman[®]

Για καθαρά χωράφια
με υψηλές αποδόσεις

Proman®

Metobromuron®

Ταυτότητα
και
Τρόπος
Δράσης

Το PROMAN® SC είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστώδων ζιζανίων στο βαμβάκι. Η δ.ο. metobromuron απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από τα φύλλα. Αναστέλλει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης (συγκεκριμένα τη φωτοσυνθετική μεταφορά ηλεκτρονίων στο φωτοσυνθετικό σύστημα PSII) με αποτέλεσμα την καταστροφή των ζιζανίων.

Απορρόφηση

Από το ριζικό σύστημα

Μετακίνηση

Μετακίνηση από το ριζικό σύστημα στα φύλλα μέσω του ξυλώματος

Ζιζανιοκτόνος δράση

Το metobromuron δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη θέση στους χλωροπλάστες και παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση


Συμπτώματα στα ζιζάνια

Συμπτώματα χλόρωσης και νέκρωσης κατά την εμφάνιση των φύλλων και την έναρξη της φωτοσύνθεσης



Τεχνική
τοποθέτηση
στο βαμβάκι

Δόση
200-250 κ.εκ.
PROMAN/στρ.
με όγκο ψεκ.υγρού
20-30 λίτρα/στρ.



Στόχος: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, από Μάρτιο έως Ιούνιο, προφυτρωτικά των ζιζανίων και προφυτρωτικά της καλλιέργειας, μετά τη σπορά της καλλιέργειας έως και πριν την εμφάνιση του υποκοτυλίου από την επιφάνεια του εδάφους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή (ημέρες):

Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.


Παρατηρήσεις:

1. Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Η δραστηριότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.
2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στον ρώγο του.
3. Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Σε αμμώδες έδαφος (ποσοστό της άμμου μεγαλύτερο από 65%) ή σε έδαφος με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη από 3%, μειώστε τη δόση σε 200 κ.εκ./στρ. Προβλήματα εκλεκτικότητας μπορούν να εμφανιστούν σε αυτά τα εδάφη σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή.
4. Ψεκάστε σε κατάλληλα προετοιμασμένο έδαφος.
5. Συνιστάται η εφαρμογή με το σκεύασμα να γίνεται το αργότερο εντός 3 ημερών μετά τη σπορά της καλλιέργειας, για την αποφυγή πιθανής φυτοτοξικότητας.

Proman[®]

Χαρακτηριστικά και οφέλη

- Υψηλή αποτελεσματικότητα ενάντια στα ζιζάνια – στόχους.
- Μεγάλη διάρκεια δράσης.
- Εκλεκτικό ως προς την καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
- Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας.

PROMAN [®] SC	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	70173 / 12.09.2016
Δραστική ουσία	Metobromuron: 50% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.• Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις• Περιέχει 1,2-βενζισοθιαζολιν-3(2H)-όνη (metobromuron). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
<p>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</p> <p>Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>	



Καθαρίζουμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: CERTIS BELCHIM B.V., Ολλανδία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr **Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος:** 1ο χλμ Ολυμπιακού
Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής. Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346,
E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr

 K&N Efthymiadis

