

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Μακριά από παιδιά. •Φυλασσεται κλειδωμένο. •Μην τρίψε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Μαζεύτε τη χυμένη ποσότητα. •Απορεύμετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμίστεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονίδιων / ατμούς / εκενφύματα. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια / τρόπουτο. •Μη ρυπαντείτε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του. (Μην ξεπλένετε τα εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά υδάτα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω συστημάτων αποχέτευσης από λιθοστρωτες επιφάνειες και δρόμους). •«Κατά την εφαρμογή σε πεπατόστορο και μοσχεύματα αγκινάρας με ψεκασμό να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια (UNE-EN14605:2005+A1:2009) και προστατευτική ενδύμαση κατά την ανάβη / φόρτωση και εφαρμογή». •«Κατά την εφαρμογή σε πράσινα φασολάκια, στα γαρύφαλλα και στις πιπεριές και μοσχεύματα αγκινάρας με σταγόνη άρδευση ή ψεκασμό να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά την ανάβη / φόρτωση και εφαρμογή». •«Κατά τη διάρκεια εφαρμογής με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα και φίλτρο αέρα, συνιστάται τα παρόμια να παραμένουν κλειστά. •Πλέοντες όλα τα προστατευτικά ρούχα μετά τη χρήση. •Για να προστατεύετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αισιόκαπη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. •Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σπαστόνι και νερό. Σε περίπτωση επαγρύς με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά. Αφιρέστε τους φακούς επαφής. Σε περίπτωση επαγρύς: Μην πρακταλέστε εμετό και μην χορηγείτε τίποτα από το σώμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβούλη και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή οδισθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Εφαρμόστε συμπληρωτική θεραπεία. **ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και τη συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίγουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τριπλούν την προηγούμενης, για τη διασφάλιση της μη περαπέρα χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος:

Να αποθηκεύεται στην αρχική της απορρυπατιστική συσκευασία σε χώρο έγρη και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΦΙΛΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

MONCUT 46 SC

Flutolanil (Φλουτολανίλ)
(χημική οράδα: benzanilide)

Συμπυκνωμένο Ενιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Flutolanil 46% β/β
Βοηθ. ουσίες: 58,09% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο

για την προστασία
από τον μύκητα
Rhizoctonia solani



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μητρείτε να προκαλέσετε αλλεργική δραστική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS No 2634-33-5).
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΟΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Προρίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60531/12-05-2016

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας: Nichino Europe Limited, 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge, Cambridgeshire, T.K. CB24 9PT, Ην. Βασίλειο.
Υπεύθυνος για την τελική θίασηση στην αγορά-ΔΙΑΝΟΜΕΑ:

Ε ΚΑΙ Ευθυμιάδη αβε

ΒΙΛΕ. Θ.ΣΠΑΣΟΣ 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•ΤΗΛ.2310 568656 •FAX:2310 798425 •e-mail: info@euonymiadisi.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΑΤΑΤΕΣ: Για Ριζοκτονίαση (*Rhizoctonia solani*) με δόση 125-187,5 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ.: υγρού: 10 λίτρα/στρ. Εφαρμογή στους κονδύλους την την στορά ή κατευθυνόμενος ψεκασμός στην γραμμή σποράς κατά τη σπορά. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: 1 (μία εφαρμογή).

ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑΚΑ: Για Ριζοκτονίαση (*Rhizoctonia solani*) με δόση 75-150 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή και ενσυμάτωση με στάγην άρδευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: 2 εφαρμογές ανά 15 ημέρες.

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ (υπαίθρου ή θερμοκηπίου): Για Ριζοκτονίαση (*Rhizoctonia solani*) με δόση 125-150 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εφαρμογή, εμβάπτιση των μοσχεύματων πριν από τη μεταρύτευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: 1 (μία εφαρμογή).

ΠΙΠΕΡΙΕΣ: Για Ριζοκτονίαση (*Rhizoctonia solani*) με δόση 75-150 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή και ενσυμάτωση με στάγην άρδευση από την εμφάνιση του 3rd πραγματικού φύλου μέχρι το ξετύλιγμα του 5th φύλου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: 1 (μία εφαρμογή).

ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ: Για Ριζοκτονίαση (*Rhizoctonia solani*) με δόση 1,25 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ.: υγρού: 50-60 λίτρα/στρ. Με ψεκασμό στα φυτά γύρω από το στέλεχος/λαιμού των φυτών μετά την μεταρύτευση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περιόδο: 1 (μία εφαρμογή).

Τρόπος εφαρμογής: 1. Με ψεκασμό του παπατόστορου και εμβάπτιση των μοσχεύματων αγκινάρας. Περιέχει αλλεργική δραστική αντίδραση. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS No 2634-33-5). 2. Στάγην άρδευση. 3. Με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος - λαιμού των φυτών.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέτετε τη συνιστώμενη δόση του σκευασμάτος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπλήρωστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδεύση. Ανάδευτη πρέπει να γίνεται και τρίτη και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξέπλυμα με άφθονο νερό. **Σποιχέα φυτοτοξικότητας:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μη εισέρχονται ανθρώποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Πατάτες, Αγκινάρα, Γαρύφαλλα: Μη εφαρμόσιμο.

Πιπέριες: 47 ημέρες.
Φασολάκια: 3 ημέρες.



190x90
0816