

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): Για Φαϊά Σήψη Ανθών και Βλαστών (*Monilia laxa*) και για Φαϊά Σήψη Καρπών (*Monilia fructigena*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση (BBCH61-87). **Δόση:** 80-120 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 80 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα για *Monilia laxa* και 120 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα για *Monilia fructigena*). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα.

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνοιξης έως και τη ωρίμανση (BBCH 61-87). Συνίσταται να εφαρμόζεται κατά την πτώση των πηλιδιών έως το κλείσιμο της σταφύλης. **Δόση:** 80-120 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 80-100 λίτρα/στρέμμα.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνοιξης έως και τη συγκομιδή (BBCH 61-87). **Δόση:** 80-120 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-120 λίτρα/στρέμμα.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (Με βρώσιμα φλοιό) (Αγγούρι - Κολοκυθάκι): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνοιξης έως και τη συγκομιδή (BBCH 61-87). **Δόση:** 80-120 γραμ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-120 λίτρα/στρέμμα.

ΦΡΑΥΟΥΛΑ (Υ&Θ): Για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*). Εφαρμογή από την έναρξη της άνοιξης έως και τη συγκομιδή (BBCH 61-87). **Δόση:** 80-120 γραμ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (Μέγιστο 120 γραμ. σκευάσματος/στρέμμα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-120 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις: - Προσοχή: Οι δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού έτσι ώστε η μέγιστη δόση του Prolectus να μην υπερβαίνει τα 120 γρ. / στρέμμα.- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας και της πίεσης προσβολής. Για μικρή πίεση προσβολής χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση ενώ σε μεγάλη πίεση τη μεγάλη. - Προτείνεται η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται προληπτικά. Να εφαρμόζεται πάντα στη συστηματική δόσολογία και να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Στο αμπέλι συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται κατευθυνόμενα στη ζώνη που βρίσκονται τα σταφύλια.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται ομοιόμορφη καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το 2/3 του απαιτημένου όγκου νερού και θέστε σε λειτουργία την ανάλυση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Prolectus και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Εφαρμόστε το ψεκαστικό υγρό αμέσως μετά την παρασκευή του και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο από 6 ώρες μετά την παρασκευή του. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. Ρυθμίστε την ανάδευση για την αποφυγή σχηματισμού αφρού.

ΜΕΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Πυρήνoκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά) και Φράουλα (Υ&Θ) μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών, εφόσον απαιτείται. Λαχανικά (Θ)(Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά) και Κολοκυνθοειδή (Θ)(Αγγούρι, Κολοκυθάκι) μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών, εφόσον απαιτείται. Αμπέλι (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα σταφύλια): 1 **Συνδυαστικότητα:** Μη το χρησιμοποιείτε σε μίγματα με Karathane Gold και Profiler. Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να πραγματοποιείται προηγούμενης δοκιμή μικρής κλίμακας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά (ημέρες): Για τα Αμπέλι: επιτραπέζια σταφύλια: 7 και οινοποιήσιμα σταφύλια: 14. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες: 1

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 8 ώρες από την εφαρμογή του για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη και 6 ώρες για τις καλλιέργειες αγρού.

Στοιχία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι απολύτως εκλεκτικό στις οινοποιήσιμες ποικιλίες του αμπελιού στις οποίες έχει δοκιμαστεί. Εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, δεν έχει καμία επίδραση στη διαδικασία ζύμωσης και στα ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού. Μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τις εξωτερικές επιφάνειες ξεπλύνοντας με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε τις εσωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε τα νερά του ξεπλύματος μέσα από την αντλία και τους αελούς. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Πλύνετε με κατάλληλο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με νερό. Απορρίψτε τα απόβρατα με ασφάλεια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1. Να εφαρμόζεται σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης και με τα οποία δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα. 2. Περιορίστε τον αριθμό των εφαρμογών Prolectus ή σκευασμάτων με δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής ομάδας σε 1 ανά 3 εφαρμογές σε σχέση με το σύνολο των εφαρμογών που πραγματοποιούνται ανά καλλιερητική περίοδο για τον έλεγχο του βοτρύτη (εντός του μεγίστου ορίου των 3 εφαρμογών / έτος). 3. Στο αμπέλι, να εφαρμόζεται ένα μόνο σκεύασμα με δραστική ουσία της ίδιας χημικής ομάδας ανά έτος. Επιπλέον συνίσταται η χρήση σκευασμάτων διαφορετικής χημικής ομάδας ανά έτος ειδικά στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται μια μόνο εφαρμογή για τον έλεγχο του βοτρύτη. 4. Ψεκάστε με ήπιο καιρό, χωρίς άνεμο, προκειμένου να αποφευχθεί διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες ή ρέματα. 5. Το pH του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 8,5, με ιδανική τιμή το 7.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαράβαστη συσκευασία σε ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα. Η θερμοκρασία να υπερβαίνει πάντα τους -10 ° C. Στις συνθήκες αυτές, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας: συσκευασίας



Prolectus™

Fenpyrazamine (φενπιραζαμίν) 50%
Εναιωρηματοποιησιμο κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Fenpyrazamine 50% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 46,8% β/β

Μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση και προληπτική δράση που παρεμποδίζει την επιμήκυνση των βλαστικών υφών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δραστική ουσία fenpyrazamine δρα παρεμποδίζοντας τη διόσυνθεση εργοστερόλης

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.535/27-5-2016

Προσοχή

Καθαρό βάρος: 600 γραμ. e

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
•Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία, και κατάλληλες μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, κατά την εφαρμογή. Οι εργατές θα πρέπει να φέρουν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν στο ψεκασμένο αγρό αμέσως/σύντομα μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμεινουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα επιμεινουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό και σαπούνι. Πλύνετε το ρουχισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για αρκετή ώρα. Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από τον/τους οφθαλμούς για να διασφαλίσετε ενδελεχώς ξεπλύμα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον υπάρξει ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτε δια στόματος σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΑΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφηστές μισαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά νερά.

Κάτοχος της έγκρισης /Παρασκευαστής σκευάσματος:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d'Affaires de Crecy-10A Rue de la Voie Lactee, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία.
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Greenfarm Χημικά Α.Ε., Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή Τηλ.: 210-6990932, fax: 2106990862, e-mail: info@gr.nufarm.com
Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας σκευάσματος:
Indalva, S.L., CTRA. La Mantaza, km 0.5 P.O. Box 160, 03300 Orihuela (Alicante), Ισπανία

Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος, Τηλ.: 2310 568656 e-mail: info@atthymiadis.gr

