

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Υδατικό αιώρημα Αζώτου  
και Μαγνησίου με ιχνοστοιχεία  
για διαφυλλικές εφαρμογές

# ΒΙΟΦΟΛ Mg

3,6-0-0 + 12 Mg + 4,3 S + Ιχνοστοιχεία



## Εξασφαλίζει την ευρωστία των φυτών - Αυξάνει την παραγωγή

- ✦ Υψηλή περιεκτικότητα σε Mg και ιχνοστοιχεία.
- ✦ Βελτίωση της υγείας των φυτών και περιορισμός της επίπτωσης των φυσιολογικών καταπονήσεών τους.
- ✦ Αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες λόγω των επιφανειοδραστικών και προστατευτικών συστατικών που περιέχει.
- ✦ Συμβατότητα στο βυτίο με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας.
- ✦ Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

## ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ



## ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το **BIOFOL Mg** είναι ένα ειδικό διαφυλλικό λίπασμα σε μορφή υδατικού αιωρήματος για την πρόληψη και τη θεραπεία των τροφοπενιών Μαγνησίου σε όλες τις καλλιέργειες όπως: **Αμπέλια - Σταφίδες (ξήρανση της ράχης), Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Πατάτες, Κηπευτικά κ.λπ.**

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η άριστη αποτελεσματικότητα του **BIOFOL Mg** οφείλεται στην υψηλού επιπέδου τεχνολογία που ενσωματώνει.

## Ειδικότερα:

- Διατίθεται στην τυποποιημένη μορφή υδατικού κρυσταλλικού αιωρήματος (suspension) υψηλής περιεκτικότητας σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία ανά μονάδα όγκου.
- Περιέχει βιολογικούς παράγοντες όπως βιταμίνη B1, κ.ά. που το καθιστούν πιο αποτελεσματικό.
- Περιέχει ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες για αποφυγή πρόκλησης φυτοτοξικότητας και για άριστη συνδυαστικότητα με τα συνήθη φυτοφάρμακα στο βυτίο.
- Περιέχει χηλικούς παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τη σκληρότητα του ψεκαστικού διαλύματος και ρυθμίζουν το pH σε επιθυμητό βαθμό.
- Περιέχει ειδικούς διαβρέκτες που βοηθούν στην ομοίμορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα και δεν επιτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα και το ξέπλυμά του από τη βροχή.
- Περιέχει ιχνοστοιχεία σε πλήρη χηλική μορφή με αποτέλεσμα την άριστη απορρόφηση και αφομοίωσή τους από τα φυτά.

## ΤΟ BIOFOL Mg ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ!

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Πρόληψη τροφοπενίας, αντιμετώπιση ξήρανσης της ράχης.	300-500cc/στρ.	2-3 εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή μετά την άνθιση, η δεύτερη κατά το κλείσιμο των τσαμπιών και η τρίτη, αν χρειαστεί, κατά την έναρξη της ωρίμανσης.
Εσπεριδοειδή	Πρόληψη τροφοπενίας.	200-400cc/στρ.	2-3 εφαρμογές. Η πρώτη πριν την άνθιση, η δεύτερη μετά την καρπώδωση και η τρίτη 2-3 εβδομάδες αργότερα.
Μηλοειδή	Πρόληψη τροφοπενίας.	300-500cc/στρ.	2-3 εφαρμογές. Η πρώτη γίνεται πριν την άνθιση, η δεύτερη όταν οι καρποί φτάσουν το μέγεθος καρυδιού και η τρίτη, αν χρειαστεί, 2-3 εβδομάδες αργότερα.
Πυρηνόκαρπα	Πρόληψη τροφοπενίας.	300-500cc/στρ.	1 εφαρμογή μετά την άνθιση και επανάληψη ανά 15 ημέρες αν χρειάζεται.
Πατάτα	Πρόληψη τροφοπενίας.	300-500cc/στρ.	2-3 εφαρμογές. Η πρώτη γίνεται 2 εβδομάδες πριν την άνθιση, η δεύτερη κατά την άνθιση και η τρίτη 2 εβδομάδες αργότερα.
Τεύτλα	Πρόληψη τροφοπενίας.	300-500cc/στρ.	1 εφαρμογή στα 6-12 φύλλα.
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	Πρόληψη τροφοπενίας.	200-400cc/στρ.	2-4 εφαρμογές. Η πρώτη γίνεται 1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση, η δεύτερη κατά την έναρξη της άνθισης και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες αν χρειάζεται.
Κολοκυνθοειδή	Πρόληψη τροφοπενίας.	300-500cc/στρ.	3-4 εφαρμογές κάθε 2 εβδομάδες με έναρξη 2 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση.
Βαμβάκι	Πρόληψη τροφοπενίας.	200-400cc/στρ.	1-2 εφαρμογές κατά την ανάπτυξη και 1 εφαρμογή κατά την άνθιση, πριν το δέσιμο των καρυδιών.
Μηδική	Πρόληψη τροφοπενίας.	200-400cc/στρ.	1 εφαρμογή μετά από κάθε κοπή και όταν τα φυτά έχουν ύψος 10cm.
Φράουλα	Πρόληψη τροφοπενίας.	300-500cc/στρ.	1 εφαρμογή στην αρχή της βλάστησης και 1 εφαρμογή λίγο πριν την άνθιση.
Λοιπές Καλλιέργειες	Πρόληψη τροφοπενίας.	200-500cc/στρ.	1-3 εφαρμογές ανάλογα με την καλλιέργεια και 1 εφαρμογή πριν την ένταση του προβλήματος.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκασμό με όγκο ψεκαστικού υγρού 100 - 150lt/στρ.

Το προϊόν προστίθεται στο βυτίο ταυτόχρονα με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση. Τα υπόλοιπα φ.π. προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας ανάμιξης. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Παρασκευαστής: **AGLUKON GERMANY**



Διανομέας: **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

[www.efthymiadis.gr](http://www.efthymiadis.gr)