

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Η δραστική ουσία zoaxamide διεισδύει γρήγορα στην εφυμνίδα των φύλλων και τσαμπιών του αμπελιού και δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση του μύκητα. Ο χαλκός έχει πολυεστιακό τρόπο δράσης και συμπληρώνει και ενισχύει τη δράση του zoaxamide αναστέλλοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα. Η ταχεία διείσδυση του zoaxamide σε συνδυασμό με τη χρήση χαλκού σε μορφή τριβασικού θειικού χαλκού καθιστούν το Amaline Flow® πολύ ανθεκτικό στην έκπλυση.

**Φάσμα δράσης:**

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		Κ.εκ./στρέμμα (max)	Κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού	
Αμπέλι	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250-280	250-280	Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε περίοδο, σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Προτιμάται η χρήση του από την καρπόδεση και ως και 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

**Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 ανά 8-12 ημέρες ανάλογα με την πίεση της προσβολής.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την πίεση της προσβολής. 3. Το εύρος του όγκου του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Να γίνεται καλή κάλυψη του αμπελιού. 4. Να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 5. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):** Αμπέλι 28.

**Συνδυαστικότητα:** - - -

**Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε κατά τα 3/4 το δοχείο ψεκασιού και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση.

Ανακινήστε καλά τη φιάλη και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Amaline Flow® και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφόσον συμπληρώσετε με νερό σταματήστε την ανάδευση για την αποφυγή σχηματισμού αφρού.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:**

Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια της αμπέλου όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του. Δεν επηρεάζει την οινοποίηση καθώς και την ποιότητα του κρασιού.



**Μεταλλικός χαλκός 26.66%**  
(σε μορφή τριβασικού θειικού χαλκού)  
**Zoaxamide: 4%**  
**Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

Η εγγυημένη σύνθεση είναι  
Μεταλλικός χαλκός 26.66% β/ο  
(σε μορφή τριβασικού θειικού χαλκού)  
Zoaxamide: 4% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 62.08% β/β

**Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση κατά του περονόσπορου στο αμπέλι.**

**Επιθλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**

**Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60345/13-12-2012

**Κάτοχος της άδειας:**  
**Nufarm S.A.S.**  
28 Boulevard Camelinat  
92233 Gennevilliers,  
Γαλλία

**Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**



**K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.  
Τηλ.: 2310 568656  
e-mail: info@efthymiadis.gr



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλένετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη / φόρτωση του προϊόντος. Οι εργάτες να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή και προστατέψτε τον από υποθερμία.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε τα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ακολουθήστε συμπληρωματική θεραπεία.  
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.** Για την προστασία των υδροβίων οργανισμών να αφήνετε αμέσαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. Περιέχει zoaxamide, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Προτείνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται με πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδίκες συνθήκες γεωργικές, φυτούργείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει άνεμος  $\geq 3$  Beaufort.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με προγράμματα επεμβάσεων κατά τα οποία θα γίνεται εναλλαγή του Amaline Flow® με μυκητοκτόνα διαφορετικής μορφής δράσης.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να φυλάσσεται μόνο στην αρχική του απαράβατη συσκευασία σε θερμοκρασία  $> 0^{\circ}\text{C}$ , σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**Περιεχόμενο:**  
**1 λίτρο e**



Grow a better tomorrow

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί Αριθμός παρτίδας: της συσκευασίας



0221