

Όαμα δράση:

Πεδίο εφαρμογής- Στόχος- Δόσεις- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και δολιβάδη ανθήκα φυτά-δένδρα, θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων): Κατά του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*), της Λυριόμυας (*Liriomyza trifolii*), του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*), *Eriophyes* spp. και της Ψύλλας (*Psylla* spp.) με δόση 75-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 100 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκασμού: υγρού 100 λίτρα/ στρ. με την έναρξη των προσβολών. **Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά:** Κατά της Ψύλλας (*Psylla pyri*, *Psylla mali*, *Cacopsylla pyri*, *Epirhmetus pyri*), των Φυλλοκροτών (*Liloscotellus* sp.), του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips* sp.) του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*), του Πανούνηχου (*Panonychus ulmi*), *Aculus schleichtendallii*, *Aculus* sp., *Eriophyes* spp. με δόση 75 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 112,5 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρ. και σε μίγμα με παραρικό λαδί 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό πριν την εκκόλιψη των αυγών. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (πριν την ανθοφορία <BCH60) ή μετά την ανθοφορία (>BCH70).

Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερικοκά: Κατά της Ψύλλας (*Psylla pyri*, *Psylla mali*, *Cacopsylla pyri*, *Epirhmetus pyri*), του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips* sp.), του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*), του Πανούνηχου (*Panonychus ulmi*), *Aculus schleichtendallii*, *Aculus* sp., *Eriophyes* spp. με δόση 75-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 100 κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/ στρ. και σε μίγμα με παραρικό λαδί 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό πριν την εκκόλιψη των αυγών. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BCH 69-89). **Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια):** Κατά του Φυλλοκροτή (*Phyllocnistis citrella*) με δόση 40 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 112,5 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρ. με δόση 75 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 112,5 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/ στρ. και σε μίγμα με παραρικό λαδί 0,25-0,3% ή άλλο μη ιοντικό προσκολλητικό με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλαστούς (BCH 09-89) (όχι κατά την ανθοφορία). **Αμπέλι:** Κατά του ακάρεου της απέλης (*Eriophyes vilis*) και του Τετράνουχου (*Tetranychus carpini*) με δόση 50-75 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 75 κ.εκ./ στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. με την εμφάνιση της προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών ΒΒCH 13-79 (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). **Τομάτα (Α/Θ), Μελιτζάνα (Α/Θ), Πιπεριά (Α/Θ):** Κατά του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*), της Λυριόμυας (*Liriomyza* spp.) και του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips* sp.) με δόση 80-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 120 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/ στρ. με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BCH 10-89). **Πεπόνι (Α), Καρπούζι (Α):** Κατά του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*) με δόση 80-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 120 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 50-120 λίτρα/ στρ. με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BCH 10-89) (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό).

Μαρούλι (Θ), Ανθός (Θ): Κατά του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*) με δόση 75-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 120 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/ στρ. με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BCH 12-55). **Μαϊντανός (Θ):** Κατά του Θρίπα (*Frankliniella occidentalis*) και του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*) (χρήση ήσσονος σημασίας) με δόση 75-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρ. με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BCH 12-55). **Δαμάσκηνα:** Κατά του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*), του Πανούνηχου (*Panonychus ulmi*), *Aculus schleichtendallii*, *Aculus* sp., *Eriophyes* spp. με δόση 75-100 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 100 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/ στρ. και σε μίγμα με παραρικό λαδί 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό πριν την εκκόλιψη των αυγών. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών (BCH 69-75).

Καρπούζι: Κατά του Τετράνουχου (*Tetranychus urticae*), του Πανούνηχου (*Panonychus ulmi*), *Aculus schleichtendallii*, *Aculus* sp., *Eriophyes* spp. με δόση 75 κ.εκ. σκευασμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 112,5 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/ στρ. με την εμφάνιση της προσβολής (πριν την ανθοφορία <BCH 60) ή μετά την ανθοφορία (>BCH 70). **Μένιτσος αριβός εραφωμών ανά κλάνη περίοδο:** Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και δολιβάδη ανθήκα φυτά-δένδρα, θάμνοι και φυτώρια δασικών δένδρων), Τομάτα (Α/Θ), Μελιτζάνα (Α), Πιπεριά (Θ), Αγγουριά (Θ), Κολοκύθι (Θ), Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Ανθός (Θ): Εως 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. **Μελιτζάνα (Α), Πιπεριά (Α), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ):** Εως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. **Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια):** Εως 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών. **Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά:** Εως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. **Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερικοκά:** Εως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών. **Αμπέλι:** Εως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14-21 ημερών. **Δαμάσκηνα, Καρπούζι:** 1 εφαρμογή. **Τελευταία επεξεργασία πριν τη συγκομιδή (ημέρες):** Καρπούζι: 60. Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Δαμάσκηνα, Αμπέλι: 28. Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερικοκά, Μαρούλι, Μαϊντανός, Ανθός: 14. Εσπεριδοειδή: 10. Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγουριά, Κολοκύθι, Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι: 3. Ανθοκόμια: 0.

Τρόπος παρασκευής ψεκατικού υγρού/διάλυματός εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του ψεκατικού με τη σωστή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευασμάτος και όπου συνιστάται λαδιού ανακατείνοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατείνοντας. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. **Στοιχεία φωτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φωτοτοξικό στις ένγκεριμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφευχθεί ο συνδυασμός ΑΜΕCΤΙΝ 1,8 ΕC με λαδί. 14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μπηκτοκτόνου Captan. **Καθαρισμός ψεκατικών μηχανημάτων:** Αδειάστε τελείως το ψεκατικό βύτιο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα υγρά πριν τα καθαρίσετε με καθαρό νερό. Ψεκασμός του ψεκατικού υγρού (3) φορές πριν το ψεκατικό υγρό (2) χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό, άσπρο και καλά αεριζόμενο χώρο.

ΑΜΕCΤΙΝ® 1,8 ΕC

abamectin (αμπεκτιν) 1,8% Χημική ομάδα avermectins Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (ΕC)


Εγγυημένη σύνθεση:
abamectin: 1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,96% β/β
(περιέχει Cyclohexanol)

UFI: W0X6-12HX-CD98-TRKV

Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχι και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατο τους από αστία.

Επιδαβές σε περιπτώση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή. Μπορεί να προκαλέσει θλάδες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Περιέχει abamectin και Cyclohexanol. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΨΡΟΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας ΥΑΑΤ: 14432/15-05-2013

Παρασκευαστής σκευασμάτος:
Syngenta Crop Protection AG,
Eλβετία.
Κατόχος της έγκρισης:
GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.,
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
15343 Αγ. Παρασκευά,
Τηλ.: 210 6990821,
fax: 210 6990862,
e-mail: info@gr.nufarm.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
K&N EARTH MATTERS
Κ&Ν ΕΓΟΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδόβ,
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο: 1 λίτρο e



Προφυλάξεις: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια. Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μύξα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. *Φοράτε ολοήμερο προστατευτικό ενδυμασία, μπότες και γάντια κατά την ανάμιξη/φύρτωση και τον ψεκασμό. *Φοράτε ολοήμερη φόρμα εργασίας κατά την επανεξέταση στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκατικό υγρό*. Διάθεση περιεχομένου/περιεχί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιάθετα. Να έχει διαθεσίμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος να επιτρέψει που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:** Συμβουλευθείτε / Ξεπνεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μη προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλένετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμεινε καλέστε γιατρό. Πλένετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Να αποφευχθεί η χορήγηση βαρbitουρικών, βενζοδιαζεπών και βαλπροϊκού οξέος. **Σε περίπτωση κατάποσης,** να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην μιλάτε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: - Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων - Για τις εφαρμογές σε αμπέλι να αφήνετε αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκατικού υγρού. - Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε 20 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 75% της διασποράς του ψεκατικού υγρού - Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλακτικά αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκατικού υγρού. - Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: - Για τις εφαρμογές σε εσπεριδοειδή να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη 15 μέτρων - Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να αφήνετε μία αφέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλιέργειες εκτάσεις. Πιθανώς επικίνδυνη για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονισόγια μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελισσάκια να απομακρυνθούν από την περιοχή για τουλάχιστον: - 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών - 43 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας υπαίθρου - 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες θερμοκηπίου για εξεπύλωση βομβινών / μελισσών από θερμοκηπία.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτώριες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδάφη με καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε ετικέτα
Αριθμός παρτίδας: ΤΗΣ ΣΕΚΕΣΙΑΣ



0422