

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διελασματική κίνηση για τη καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου, σιταριού, κριθαριού, σίκαλης και βρώμης. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την λειτουργία της φωτοσύνθεσης δρώντας ως αναστολέας του φωτοσυστήματος II.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αραβοσίτος: Για Πλατύφυλλα ζιζάνια (*), με μεταφυτρωτικό ψεκασμό όταν ο αραβοσίτος έχει 3-4 πραγματικά φύλλα έως το στάδιο των 8 φύλλων. Μία (1) εφαρμογή με δόση 70-120 κ.εκ σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα.

Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: Για Πλατύφυλλα ζιζάνια (*), με μεταφυτρωτικό ψεκασμό όταν τα σιτάρια έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα έως το στάδιο του πλήρους αδελφώματος. Μία (1) εφαρμογή με δόση 70-180 κ.εκ σκευάσματος/στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα.

* Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus spp.*), Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Κενταύριο (*Centaurea cyanus*), Κεράστιο (*Cerastium arvense*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), *Diploaxis spp.*, Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Falloria convolvulus*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*), Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Ράπιστρο (*Rapistrum rugosum*), Μυρώνι (*Scandix pectiniferis*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Στελλάρινα (*Stellaria media*), Θλάσι (*Thlaspi arvense*), Βερόνικα (*Veronica spp.*), Μύαγρο (*Myagrum perfoliatum*).

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα ζιζάνια που είναι στο στάδιο του σπόρου καθώς και όλα τα αγρωστώδη ζιζάνια.

Παρατηρήσεις:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης (έως το στάδιο των 4-5 φύλλων).
2. Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου και της πυκνότητας των ζιζανίων.
3. Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε μίγματα με ζιζανιοκτόνο NICODAN OD.
4. Η εφαρμογή να γίνεται με θερμοκρασία άνω των 10 ο C και σε κάθε περίπτωση στις πιο θερμές ώρες της ημέρας.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοίμορφος ψεκασμός με 30 - 50 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρ. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξεπλύνετε το βυτί και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό & απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Καλαμπόκι, Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη: 90 ημέρες.

BROMOTRIL® 225 EC

Βρομοxynil 22,5 % θ/ο

Χημική Ομάδα βενζονιτριλίου

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Βρομοxynil 22,5 % β/ο
(υπό μορφή οκτανοϊκού εστέρα 32,7% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 66,4 % β/β

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με περιορισμένη διελασματική κίνηση για τη καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου, σιταριού, κριθαριού, σίκαλης και βρώμης.

- Επιθλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Επιθλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Υποπτο για πρόκληση θλάξης στο έμβριο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Περιέχει Βρομοxynil octanoate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) : 70134/13-10-2015

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse,
A-4021 Linz, Αυστρία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:
1 λίτρο e



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Nufarm
Grow a better tomorrow

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστετε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνεύσετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Οι εργάτες να φορούν γάντια και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **Σε περίπτωση κατάποσης,** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
• Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. (24 ώρες)

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτ. προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό Ξέπλυμα (τα νερά του Ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό, και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως.

Ημερομηνία παραγωγής:
Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε φιάλη

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΤΟΠΟΡΕΙΑΣ

0120



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 290*153 mm