

CARMINA MAX

Chlorotoluron 60% + Diflufenican 4%

Συμπκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία 1: Chlorotoluron 60 % β/ο

Δραστική ουσία 2: Diflufenican 4 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 44,86 % β/β

UFI: 0J5V-XN0K-SEAC-PQ7M

Ζιζανιοκτόνο για την προφυτρωτική ή μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση, περιέχει Chlorotoluron. Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. Υποπτο για πρόκληση θλάξης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει μίγμα 5-chloro-2methyl-2H-isothiazole-3-one + 2methyl-2Hisothiazole-3-one.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμώσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Διάθεση του περιεχομένου / περιεκτική σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά το ψεκασμό».

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Σε όλα τα στάδια εφαρμογής να φοράτε κατάλληλα γάντια νιτρίλιου, προστατευτική ενδυμασία διαπερατή από το ψεκαστικό υγρό, καταλληλές μπότες καθώς και προστατευτικά γυαλιά ανδεδίχαστα σε χρυσά. Κατά την ανάμιξη και φόρτωση καθώς και κατά τον καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων να φοράτε επίπλεον και αδιάβροχο φόρεμα ή μακρυμάνικη ποδιά πάνω από την προστατευτική ενδυμασία.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες από μη γεωργική γη. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να μην εφαρμόζεται το προϊόν σε τεχνητά στραγγιζόμενα εδάφη. Να μην χρησιμοποιείται το σκεύασμα την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών (Μάρτιος-Αυγούστος).

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70171/01-09-2016



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας /
Παρασκευαστής σκεύασματος:
Nufarm GmbH & Co. KG,
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz,
Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας /
Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά /
Διανομή:

K&N E
EARTH MATTERS

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Nufarm

Grow a better tomorrow

Περιεχόμενο: 5 λίτρα e

Κατορία και τρόπος δράσης: Το **CARMINA MAX** απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες. Δρα τόσο σε ζιζάνια που έχουν φυτρώσει κατά τη στιγμή της εφαρμογής, όσο και σε ζιζάνια που βλασταίνουν σε διάστημα μερικών εβδομάδων από την εφαρμογή. Σε βιοχημικό επίπεδο, το Diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδίων, προκαλώντας την φωτοσύνθεση και οδηγεί στο θάνατο του φυτού, ενώ το Chlorololuron αναστέλλει τη φωτοσύνθεση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	Δόσεις σκευάσματος		ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
		κ.κκ. Σκευ.στρ. (μγ/λίτ)	Όγκος υγρού (λίτρα/στρ.)	
Χειμερινά Σπέρη: Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) Κριθάρι	Πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	250	15-30	Ψεκασμός με μεταφωφωρικά (BBCH00) ή μεταφωφωρικά (BBCH 12-29)

Παρατηρήσεις:

Καταπολεμούμενα ζιζάνια σε προφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια: *Chamaemelum mixtum* (Ανθεμίδα), *Aphanes arvensis* (Αλχημίδα), *Matricaria recutita*, *Matricaria perforata* (Χαμομήλι), *Myosotis arvensis* (Μουστόγι), *Sinapis arvensis* (Άγριο σινάπι), *Viola tricolor* (Άγριοπανόσος), *Arabisidopsis thaliana* (Αραβιδόφι), *Cerastium glomeratum* (κεράριο), *Inula viscosa*, *Ranunculus sardous* (ρανούκουλος), *Mibora minima*. **Αγρωστώδη:** *Apera spica-venti* (Ανεμώχορτο), *Lolium multiflorum* (Ηρα), *Lolium perenne* (Πολυετής ήρα), *Poa annua* (ετήσια πόα), *Poa trivialis* (τραχεία λιβαδοπόα). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** *Alopecurus myosuroides* (Αλεπουπόρι), *Raphanus raphanistrum* (Ραπανίδα).

Καταπολεμούμενα ζιζάνια σε μεταφωφωτική εφαρμογή:

Πλατύφυλλα ζιζάνια: *Chamaemelum mixtum* (Ανθεμίδα), *Aphanes arvensis* (Αλχημίδα), *Sinapis arvensis* (Άγριο σινάπι), *Viola tricolor* (Άγριοπανόσος), *Ranunculus sardous* (Ρανούκουλος), *Cardamine hirsuta* (καρδαμίνι), *Euphorbia hirsutissima* (μεγάλη γυαλατιάδα), *Legosia spreculovenensis*, *Mercurialis annua* (ακαρολάχανο), *Rapistrum rugosum* (ράπιστρο), *Stellaria media* (ατελλάριδα), *Veronica agrestis*, *Veronica persica*, *Veronica hederifolia* (βερωνική), *Aethusa cynapium* (αϊθούδα), *Lamium purpureum* (παρπούρι λαίμο), *Fumaria officinalis* (καπνοχορτό), *Papaver rhoeas* (παπαρούνα). **Αγρωστώδη:** *Apera spica-venti* (Ανεμώχορτο), *Poa annua* (ετήσια πόα). **Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:** *Lolium multiflorum* (Ηρα)

1. Σε πολύ ελαφριά εδάφη συνιστάται η μεταφωφωτική εφαρμογή του.
2. Μπορεί να εφαρμοστεί μεταφωφωτικά σε εδαφός που έχει παγώσει, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στη περίπτωση αυτή να μην εφαρμόζεται σε περιόδους με έντονη διακίμανση θερμοκρασίας.
3. Να μην εφαρμόζεται το **CARMINA MAX** στη ποικιλία χειμερινού σκληρού σιταριού "Αριθμός".

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1 εφαρμογή

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με χαμηλή πίεση, μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30PSI), με τα συνήθη ψεκαστικά εδαφόδια, χορηγοσιπώντας 15-30 λίτρα νερού στο στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εξοπλισμένα από προηγούμενη χρήση στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος, ζιζάνια ή δοχεία του ψεκαστικού μηχανήματος, κατά τα 3/4 με νερό. Βάζετε σε λειτουργία τη αντάραξη. Ανακατεύετε το δοχείο του σκευάσματος και προσθέτετε την απαιτούμενη δόση μέσα στο δοχείο ψεκασμού. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την αναδευση. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Το ψεκαστικό διάλυμα να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Επιπλέον ενδελέχεια τον εξοπλισμό εφαρμογής μετά τη χρήση. Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με ποσότητα νερού τουλάχιστον 30% της χωρητικότητας της δεξαμενής. Στη συνέχεια αφήστε να στραγγίσει πλήρως.

Συνδυαστικότητα: Δε συνιστάται η ανάμιξη με υγρά λίπασματα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείνης ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει: Να εφαρμόζεται όταν επικρατούν κανονικές καιρικές συνθήκες, με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C. • Για την αποφυγή της διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει. • Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Γενικά: Εάν ζητηθεί ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχτή του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε με άφρονο σαπούνι και νερό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε προσεκτικά με άφρονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών επιμένει, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. **ΑΝΤΙΔΟΤΑ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 210 77 93 777.**

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στις δραστικές ουσίες chlorololuron και diflufenican.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της παραστατευμένης καλλιέργειας: Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά στον ίδιο αγρό, με τις ακόλουθες ανανεϊστικές καλλιέργειες:

Περίοδος	Χωρίς άρση	Με άρση
Πριν το τέλος Νοεμβρίου	Αραβοσίτος, πατάτα, σόργο, σόγια και μηδική	Κριθάρι, λινάρι, τεύτλα και πασόλια
Δεκέμβρι - Ιανουάρι	Αραβοσίτος	Κριθάρι, πατάτα, σόργο
Φεβρουάρι και μετά	-	Πατάτα

Σε κάθε περίπτωση να μεσολαβεί ένα διάστημα ασφαλείας 3 μηνών από την εφαρμογή του **CARMINA MAX** μέχρι την εγκατάσταση νέας καλλιέργειας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της παραστατευμένης καλλιέργειας:** Μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, ελακοζαμβή, ηλιανθός, σόγια, πασόλια, μηδική, λινάρι, σόργο, πατάτες, και τεύτλα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του.

Στοιχία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του. Περιέχει chlorololuron: Βεβαιωθείτε ότι η ποικιλία σιταριού, που έχει σπαρθεί είναι ανθεκτική σ' αυτή τη δραστική ουσία. Κατά τον 1^ο-2^ο μήνα μετά την εφαρμογή μπορεί να παρατηρήσει παροδική ευαισθησία σε ορισμένες ποικιλίες σιταριών.

Τελεία επάλειψη πριν τη συγκομιδή (σημεία): Σιτάρι, Κριθάρι: Μη εφαρμόζοιμο (Καθώς είναι από το χρόνο εσθροσύνης).

Συνθήκες αποθήκευσης χρονικά σταθερού του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-20°C.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστράφουν με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποθέτουμε σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

UFI: 0J5V-XN0K-SEAC-P07M

bar code