

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το **CARNADINE** είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρεις (2 - 3) φορές με καθαρό νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Να μη γίνει επανεισόδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερ/νία παρασκευής του.



CARNADINE® 20 SL



Acetamiprid
(χημική ομάδα: Νεονικοτινοειδή)

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Acetamiprid: 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % β/β

UFI: K5CF-N9KK-UJA5-WADX

**Διασυστηματικό
εντομοκτόνο επαφής και
στομάχου, με ευρύ φάσμα
δράσης εναντίον
μυζητικών εντόμων και
μασητικών εντόμων σε
πολλές καλλιέργειες**

Επιθλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Υποπνο για πρόκληση θάλαθς στο
έμβρυο.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθ. Αδείας Διαθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14661 / 31-05-2018

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse,
A-4021 Linz, Austria

Παρασκευαστής:
Nufarm Europe GmbH,
Germany

Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά:



K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Διάθεση περιεχομένου/περιεκτώσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Για εφαρμογή σε δέντρα και στο αμπέλι: "Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή". Για εφαρμογή σε θερμική: "Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή". • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια."

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

UFI: K5CF-N9KK-UJA5-WADX

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λεισθρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια:

- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ για εφαρμογή σε ντομάτα μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf).
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ για εφαρμογή σε πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, ηλιά και αχλαδιά.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%, σε δαμασκηνιά.
- αψέκαστη ζώνη 30 μ ή αψέκαστη ζώνη 20 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε κερασιά.
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή.
- αψέκαστη ζώνη 50 μ με φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση).
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε ελιά.
- Για να προστατέψετε τα αρθρώματα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη:
- 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή νωρίς), βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά.
- 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή αργά) και κερασιά.
- 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε αμπέλι (ονοποποίηση και επιτραπέζιο), δαμασκηνιά, μηλιά και αχλαδιά.
- 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% σε ντομάτα, και μελιτζάνα.
- 15 μ ή 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε ελιά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
"Διαβάστε στην πίσω σελίδα πριν από τη χρήση"

Περιεχόμενο:
1 λίτρο e

Nufarm
Grow a better tomorrow



Ημερ/νία παραγωγής: Βλέπε
Αριθμός παρτίδας: φιάλη



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Λάιμ, Φράπα): Για **Φυλλοκνίστη** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-140 λίτρα / στρέμμα. Για **Πράσινη Αφίδα, Αφίδα θαμνιάκιου, Μαύρη αφίδα, Ανατολική μύγα των καρπών** (Bactrocera dorsalis) και Μύγα των ροδάκινων** (Bactrocera zonata)** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-140 λίτρα / στρέμμα. Για **Κόκκινη Ψώρα, Παρλаторία και Ψευδόκοκκο** με 50-70 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα / στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Φυλλορύκτες** με 25-35* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 70-100* λίτρα / στρέμμα. Για **Πράσινη Αφίδα** με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Ρόδινη Αφίδα και Αφίδα αχλαδιού** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** με 35-50* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-70* λίτρα / στρέμμα. Για **Οπλοκρόμη** με 35-50* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-70* λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): Για **Πράσινη Αφίδα, Φυλλορύκτες και Τζιτζικάκια** με 25-35* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 55-80* λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες (Hyalopterus pruni, Brachycaudus sp.)** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα και Ανάραση** με 35-50* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40-55* λίτρα / στρέμμα. Για **Θρίπες** με 35-50* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40-55* λίτρα / στρέμμα.

Δαμασκηνιά: Για **Αφίδες και Φυλλορύκτες** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.

Κερασιά: Για **Ραγολέτη, Ανατολική μύγα των καρπών** (Bactrocera dorsalis) και Μύγα των ροδάκινων** (Bactrocera zonata)** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Μαύρη Αφίδα** με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Ελιά (Ελαιοποίηση): Για **Πυρηνότητη** με 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και

καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Δάκο της ελιάς, Ανατολική μύγα των καρπών** (Bactrocera dorsalis) και Μύγα των ροδάκινων** (Bactrocera zonata)** με 25-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Ελιά (Επιτραπέζια): Για **Πυρηνότητη** με 45 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας ή καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Για **Δάκο της ελιάς, Ανατολική μύγα των καρπών** (Bactrocera dorsalis) και Μύγα των ροδάκινων** (Bactrocera zonata)** με 45 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμίων στις παγίδες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο): Για **Τζιτζικάκια** με 25-35* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 70-100* λίτρα / στρέμμα. Για **Ευδεμίδα** με 35-45* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 55-70* λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι: Για **Αφίδες και Καφέ Βρωμούσα** (Halyomorpha halys)** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα / στρέμμα.

Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι: Για **Αφίδες (Nasonovia ribis-nigri)** με δόση 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)** με δόση 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα: Για **Δορυφόρο** με 10-15 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα (Υπαίθρου): Για **Πράσινη Αφίδα** με 20-25* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100* λίτρα / στρέμμα. Για **Αλευρώδεις** με 35-50* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-85* λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα (Θερμοκηπίου): Για **Πράσινη Αφίδα** με 20-25* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100* λίτρα / στρέμμα. Για **Αλευρώδεις** με 35-50* κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (max 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-70* λίτρα / στρέμμα.

Μελιτζάνα (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Για **Πράσινη Αφίδα** με 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Αλευρώδεις, Ανατολική μύγα των καρπών** (Bactrocera dorsalis) και Μύγα των ροδάκινων** (Bactrocera zonata)** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού

(35-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα / στρέμμα.

Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο (Υπαίθρου): Για **Πλουτέλλα** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Ελαιοκράμβη: Για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. και για **Σκαθάρι της γύρης** με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

- Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Ελιά (επιτραπέζια), Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο), Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι, Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Κουνουπίδι (Υ), Μπρόκολο (Υ), Λάχανο (Υ): **1 εφαρμογή**.
- Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 60 ημερών**.
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Λάιμ, Φράπα): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 ημερών**.
- Δαμασκηνιά, Βαμβάκι, Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 20 ημερών**.
- Κερασιά, Ελιά (Ελαιοποίηση): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών**.
- Πατάτα, Ελαιοκράμβη: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
2. Μην πεσάξετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομοφιλή επικονίαση.
3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ/100 λίτ. ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

* Συνδυάζεται η μικρή δόση με τον μεγάλο όγκο νερού και αντίστροφα ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση στο στρέμμα.

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην καφέ βρωμούσα του θαμνιάκιου και κατά της ανατολικής μύγας των καρπών και της μύγας των ροδάκινων στις καλλιεργείες εσπεριδοειδών, κερασιών, ελιάς, μελιτζάνας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): **60 ημέρες**.
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Φράπα): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): **30 ημέρες**.
Επιτραπέζια ελιά: **28 ημέρες**.
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζια): **21 ημέρες**.
Ελαιοκράμβη: **20 ημέρες**.
Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ/στρέμμα), Βαμβάκι, Δαμασκηνιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Τομάτα (Υ): **14 ημέρες**.
Λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): **10 ημέρες**.
Πατάτα, Μελιτζάνα (Υ), Ελιά ελαιοποίηση: **7 ημέρες**.
Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά: **3 ημέρες**.