

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το **CARNADINE** είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικωτινοειδών και δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με ανάδευση σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρεις (2 - 3) φορές με καθαρό νερό.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Να μη γίνει επανεισόδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε εσπεριδοειδή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του απαρβατιστή συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερ/ία παρασκευής του.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

"Διαβάστε στην πίσω σελίδα πριν από τη χρήση"

CARNADINE® 20 SL

Acetamiprid
(χημική ομάδα: Νεονικωτινοειδή)

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Acetamiprid: 20 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % β/β

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον μυζητικών εντόμων και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες

Επιθλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔ): 14661 / 31-05-2018

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse,
A-4021 Linz, Αυστρία

Παρασκευαστής:
ADAMA-Agan, Ltd., Ισραήλ

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Greenfarm Χημικά Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
Αγία Παρασκευή
τηλ.: 210 6990 932

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομή:

K&NE
EARTH MATTERS
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Ξίνδος,
Τηλ.: 23 10 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:
1 λίτρο e



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. • Διάθεση περιεχομένου / περιεκτική σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Για εφαρμογή σε δέντρα και στο αμπέλι: "Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή". Για εφαρμογή σε θερμοκήπιο: "Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή". "Κατά την επανεισόδo να φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια".

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μία:

• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ για εφαρμογή σε ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, λχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, μαρούλια, σκάρφα και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf).

• φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ για εφαρμογή σε πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη.

• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε **θερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά.**

• φυτική ζώνη ανάσχεσης 15μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%, σε **δαμασκηνιά.**

• αψέκαστη ζώνη 30μ ή αψέκαστη ζώνη 20μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε **κερασιά.**

• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ, ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε **εσπεριδοειδή.**

• αψέκαστη ζώνη 50μ με φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε **εσπεριδοειδή** (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση).

• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ. με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε **ελιά.**

Για να προστατέψετε τα αρθροπόδα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργημένη γη:

• 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε **εσπεριδοειδή** (εφαρμογή χωρίς), **θερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά.**

• 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε **εσπεριδοειδή** (εφαρμογή αργά) και **κερασιά.**

• 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε **αμπέλι** (όνοποιοίσιμo και επιτραπέζιο), **δαμασκηνιά, μηλιά και αχλαδιά.**

• 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% σε **ντομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα.**

• 15 μ. ή 10 μ. με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μ. με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε **ελιά.**

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε φιάλη

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΣΥΦ
Εθνική Ένωση Σηματοδότησης

1219



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Λάιμ, Κουμ-κουάτ, Φράπα): Για **Φυλλοκνίστη** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-140 λίτρα / στρέμμα.

Για **Πράσινη Αφίδα, Αφίδα θαμβακίου και Μαύρη αφίδα** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-140 λίτρα / στρέμμα. Για **Κόκκινη Ψάρα, Παρλατόρια και Ψευδόκοκκο** με 50-70 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα / στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για **Φυλλορύκτες** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Πράσινη Αφίδα** με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Ρόδινη Αφίδα** και **Αφίδα αχλαδιού** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Οπλοκάμψη** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά): Για **Πράσινη Αφίδα, Φυλλορύκτες** και **Τζιτζικακία** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** (*Hyalopterus pruni*, *Brachycaudus* sp.) με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα και Ανάρσια** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Θρίπες** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Δαμασκηνιά: Για **Αφίδες** και **Φυλλορύκτες** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα. Για **Καρπόκαψα** με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.

Κερασιά: Για **Ραγολέτη** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για **Μαύρη Αφίδα** με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Ελιά: Για **Πυρηνότητη** με 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Δάκο της ελιάς** με 25-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο): Για **Τζιτζικακία** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Ευδεμίδα** με 35-45 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι: Για **Αφίδες** και **Καφέ Βρωμούσα** (χρήση ήσσονος σημασίας)* με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα / στρέμμα.

Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Κάρδαμο, Γεοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι: Για **Αφίδες** (*Nasonovia ribis-nigri*) με δόση 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*) με δόση 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα: Για **Δορυφόρο** με 10-15 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα / στρέμμα. Για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 30-60 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαιθρου και Θερμοκηπίου): Για **Πράσινη Αφίδα** με 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για **Αλευρώδεις** με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα / στρέμμα.

Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο (Υπαιθρου): Για **Πλουτέλλα** με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Ελαιοκράμβη: Για **Αφίδες** με μέγιστη δόση 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. και για **Σκαθάρι της γύρης** με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο- Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

- Αμπέλι, Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): **Κάρδαμο, Γεοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι**, Κουνουπίδι (Υ), Μπρόκολο(Υ), Λάχανο (Υ): **1 εφαρμογή**.
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Λάιμ, Κουμ-κουάτ, Φράπα): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 ημερών**
- Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για Καρπόκαψα: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημερών**
- Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για όλους τους υπόλοιπους εχθρούς, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά), Δαμασκηνιά, Βαμβάκι, Τομάτα, Πιπεριά Μελιτζάνα (υπαιθρου και θερμοκηπίου): **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 20 ημερών**
- Κερασιά, Ελιά: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών**
- Πατάτα, Ελαιοκράμβη: **2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.
2. Μην ψεκάσετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικοινωσία.
3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων συν κ.εκ/100 λιτ. ψεκαστικού υγρού, η δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην Καφέ Βρωμούσα του Βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ/στρέμμα), Βαμβάκι, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερκοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο: **14 ημέρες**
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): **60 ημέρες**
Εσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Κουμ κουάτ, Φράπα): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): **30 ημέρες**
Ελαιοκράμβη: **20 ημέρες**
Σκαρόλα και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): **10 ημέρες**
Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζιο), Μαρούλι, Πατάτα, Πιπεριά (Υ&Θ), Μελιτζάνα (Υ), Τομάτα (Υ), Ελιά: **7 ημέρες**
Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά: **3 ημέρες**