



Cymoxanil
(Χημική ομάδα: Ακεταμίδια)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο για το έλεγχο του περονόσπορου της πατάτας με προστατευτική δράση

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστική ουσία: cymoxanil 45 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 54,08 % (β/β)

UFI: 4HH8-J045-J00M-VR9X

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: **500 γραμμάρια**

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.,

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,

PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60447 / 11-02-2015

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο για το έλεγχο του περονόσπορου της πατάτας με προστατευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΤΑΤΑ: Για Περονόσπορο, με max δόση 25 γραμ. σκευάσμ./στρ. (ή 42-84 γραμ. σκευάσμ/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-60 λίτρα/στρ. Εφαρμογές την άνοιξη - καλοκαίρι μετά την έκπτυξη του 9^{ου} φύλλου. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 έως 6 εφαρμογές σε μείγμα ανά 7 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

Να χρησιμοποιείται συστηματικά σε μείγμα με ένα προληπτικό μυκητοκτόνο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος υπέργειων τμημάτων πατάτας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιεργείες και δόσεις εφαρμογής. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** 48 ώρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Μην υπερβείτε τις 6 εφαρμογές ανά έτος για προϊόντα με βάση το cymoxanil, για να περιορίσετε τον κίνδυνο εμφάνισης ανθεκτικών μορφών.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται η εναλλαγή ή ο συνδυασμός του DRUM, στο ίδιο αγροτεμάχιο εντός της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες διαφορετικών χημικών οικογενειών ή με διαφορετικές δράσεις (mancozeb, propanoic acid, copper compounds, fluazinam, folpet, zoxamide, difenoconazole και dimethomorph).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Πατάτα: 1 ημέρα



Cymoxanil
(Χημική ομάδα: Ακεταμίδια)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο για το έλεγχο του περονόσπορου της πατάτας με προστατευτική δράση

Εγγυημένη Σύνθεση:

Δραστική ουσία: cymoxanil 45 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 54,08 % (β/β)

UFI: 4HH8-J045-J00M-VR9X

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για την υδρόβια ζωή με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: **500 γραμμάρια**

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.,

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,

PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60447 / 11-02-2015

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. • Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμού/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε αν χρειάζεται το δοχείο ή την ετικέτα στον γιατρό ή καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

UFI: 4HH8-J045-J00M-VR9X

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Ημερομηνία παραγωγής/ Αριθμός παρτίδας:



5 200252 691482 >

