



drum flow SC

Cymoxanil

(Χημική ομάδα: Ακεταμίδια)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Τοπικά δισυστηματικό μυκητοκτόνο με θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου.

Εγγραμμένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Cymoxanil 22.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 78.76 % β/β

UFI: DKY0-A08D-X002-AGD4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει cymoxanil και 2 benzisothiazol-3(2H)-one.
- Υπόπνο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **500 κ.εκ.**

Κάτοχος της άδειας: CERTIS BELCHIM B.V.
Stadsplein 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 61056 / 31.01.2022

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Τοπικά δισυστηματικό μυκητοκτόνο με θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου. Δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΤΑΤΑ: Για Περονόσπορο (*Phytophthora infestans*), με max δόση 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 15-30 λίτρα/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ^{PMH} (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Περονόσπορο (*Plasmopara viticola*), με max δόση 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 15-30 λίτρα/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την αρχή της βλάστησης έως την αλλαγή του χρώματος των καρπών. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις του Γεωργικών Προειδοτήσεων.
2. Στην καλλιέργεια του **αμπελιού** το DRUM FLOW θα πρέπει να χρησιμοποιείται **ΜΟΝΟ** σε συνδυασμό με το μυκητοκτόνο FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG (δ.ο. folpet) στην συγκεκριμένη δόση (200 γρ./στρέμμα).
3. **Να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανία.** Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεχόμενη η απουσία φωτοξυζότικης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδέοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

Στοιχεία φωτοξυζότικης: Δεν είναι φωτοξοτικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα:

- Αμπέλι: 4 ημέρες.
- Πατάτα: Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει Cymoxanil που ανήκει στην ομάδα 27 (ανώστου μηχανισμού δράσης) κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται ο συνδυασμός ή εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Στην καλλιέργεια του **αμπελιού** να χρησιμοποιείται το DRUM FLOW MONO σε μίγμα με το σκεύασμα FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG. Στην περίπτωση αυτή τηρείτε: • τα μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών και • το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής όπως αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):

Πατάτα: 7 ημέρες

Αμπέλι [επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες]: 14 ημέρες

Δηλώσεις προφύλαξης:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα απομικρής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα απομικρής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση». «Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή». «Φοράτε γάντια, μακρμάνια, μακρομάνιο ποικύμιο και μακρύ παντελόνι κατά την επανέσοδο στην καλλιέργεια».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα πολύ καλά με νερό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείτε θεραπεία συμπτωματική.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων 210-7793777.

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθωτρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε καλλιέργεια πατάτας με όξινα εδάφη (pH < 6.4).

UFI: DKY0-A08D-X002-AGD4

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ριχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



Ημερομηνία παραγωγής:
Αριθμός παρτίδας:

