

FLOW® 50 SC

Ζιζανιοκτόνο

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Fluometuron (φλουομετουρόν) 50%

Εγγραμμένη σύνθεση:
Fluometuron: 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56,70 % β/β

**ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΟ- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ Ή
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ.**

**Επιθλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.**

**Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην πρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνεύτε τα εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να αποφεύγεται η ελεύθερη απορροή στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής». «Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα». «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70141/30-11-2015

Κάτοχος της άδειας: **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**,
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231-Χαλάνδρι
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Greenfarm Χημικά Α.Ε., Μεσογείων 487 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή,
Τηλ.: 210-6990932, e-mail: info@gr.nufarm.com
Παρασκευαστής σκευασματος: **ADAMA AGAN Ltd**
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel

Διανομέας: **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

1217

Περιεχόμενο: **10 λίτρα** e



ΠΡΟΣΟΧΗ



FLOW® 50 SC

Φάσμα δράσης:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόση (κ.εκ./στρ.)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος
Βαμβάκι	Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	240-400	30-60	Πριν τη σπορά, με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 5-8 εκ.	1
		300+100 H 200+200		Προφυτρικά. Εφόσον δεν ακολουθήσει βροχή, να ακολουθηθεί άρδευση με 20-50 m3 νερό / στρέμμα.	1
		200		«Σπαστή» εφαρμογή προσπαρτικά, και προφυτρικά, με ενσωμάτωση	2
				Μετά το φύτεμα των βαμβάκοφυτων και όταν αυτά έχουν ύψος 10 – 15 εκ., με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση τους	

Κατάλογο καταπολεμούμενων ζιζανίων:

Προσπαρτική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*). **Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρικά σε αναλογία: 300 κ.εκ. + 100 κ.εκ. ή 200 κ.εκ. + 200 κ.εκ.): Καλή αποτελεσματικότητα:** Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Τάτουλα (*Datura stramonium*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*).

Προφυτρική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Λουβουδιές (*Cheopodium spp*), Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*).

Μεταφυτρική εφαρμογή: Καλή αποτελεσματικότητα: Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*). **Μέτρια αποτελεσματικότητα:** Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποίηστε χαμηλότερες δοσολογίες. 2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή. 3. Η μεταφυτρική εφαρμογή συνιστάται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή προφυτρική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ. (σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.εκ./στρ. με το σκευασμα ανά έτος. 4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλ. «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και όρα διασυστηματικά παρεμπίδοντα τη φωτοσύνθεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοίομορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρικά ή μεταφυτρικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβάκοφυτων, όταν αυτά έχουν ύψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μικρό τύπου σκούπας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενική συμβουλή: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας εκθέσεως: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Συμπτώματα:** Δυσκολία στην αναπνοή, αταξία, αδυναμία, υπνηλία. **Αντιδοτο/θεραπεία:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά το σκευασμα, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα αυτού σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. **Χρονική διάσταση ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:** - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκευασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο βαμβάκι. - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δίμηνες από την εφαρμογή του και βαθύ όργωμα. - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευασμα: Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνδυάζεται μεθειοκαρβαμικά ζιζανιοκτόνα. Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Stomp Aqua 455 CS, Energiser EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilerst 330 EC, Abilerst 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin). **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά του βαμβάκιου σε περίπτωση μεταφυτρικής εφαρμογής είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα μετκ 2 με 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο σπρός και τα ίχνη του προϊόντος. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενεργείας. Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε ψυκτικούς που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασματος:** Αποθηκεύεται στο στην αρχική του παραβίαση της συσκευασίας, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0°C προστατευμένο από απ' ευθείας εκθέση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής: } Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας: }

1217

