

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκάστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκάστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην πρῶτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.  
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο, όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.  
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

## ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη 16 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα (για τα Πυρηνόκαρπα) και 14 μέτρων (για τα Μηλοειδή).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τριτμήμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας:  
Βλέπε άνω μέρος της φιάλης



01/21



# Indar™ 5EW

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

### Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: Fenbuconazole: 5 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 94,85 % β/β  
Περιέχει Pestiflo 381  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



## Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

## ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

## ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΑΔΑ: 60504/29-01-2016

Κάτοχος της άδειας: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, Τ.Κ. 15232  
Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: +30 2106889700  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, Διανομή:



Κ&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος  
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

\*\* Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της

Περιεχόμενο:  
**1 λίτρο**

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά-Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά (ήσσονος σημασίας): Για Φουζιλιάδιο, με δόση 65-100 κ.εκ. σκευάσμου./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 100 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσινιά: Για Φαϊά Δήψη, Ωιδίο, Κυλινδροσπώριο κερασιάς, Σκωρίαση, Ανθράκωση, με δόση 100-300 κ.εκ. σκευάσμου./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 10 ημέρες.

**Αμυγδαλιά:** Για Φαϊά Σήψη με δόση 150-420 κ.εκ. σκευάσμου./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 35-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**Φιστικιά (ήσσονος σημασίας):** Για Σεπτόρια, Σκωρίαση, Βοτρουσφαίρια, με δόση 150-420 κ.εκ.σκευάσμου./100λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 35-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές ανά 7 ημέρες.

**Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες):** Για Ωιδίο, με μέγιστη δόση 75 κ.εκ. σκευάσμου./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 75 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 4 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες.

**Ελιά:** Για Κυκλοκόνιο, με μέγιστη δόση 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 150 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφανής από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

**Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:** Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ) & Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ): Για Ωιδίο, με δόση 100-250 κ.εκ. σκευάσμου./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή max 100 κ.εκ. σκευάσμου./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 3 εφαρμογές ανά 8 ημέρες.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διαχειρίση ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.

2. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας μουσμουλιά και φιστικιάς δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

## ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκάσμος φυλλώματος με πλήρη διαβροχή.

## ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινείτε καλά πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκάστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκάστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκάστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκάσμου.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν αναμινύεται με ακαλικής αντίδρασης σκευάσματα.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:**

Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκάστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στην ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκάσμο και πριν στεγνώσει το ψεκάστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο.

## ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά-Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): **28 ημέρες.**
- Αμυγδαλιά, Φιστικιά: **120 ημέρες.**
- Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκυθάκια (Υ): **3 ημέρες.**
- Κερασιά, Βυσινιά: **5 ημέρες.**
- Ελιά: **Μη εφαρμοσίμο** (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής).

