



**Indar**<sup>TM</sup>

5EW

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Προστατευτική Δράση  
και Θεραπεία



Dow AgroSciences



**K&NE**  
EARTH MATTERS



# Indar™

## 5EW

### ▶ Τι είναι το Indar™ 5EW;

Πρόκειται για ένα **διασυστηματικό μυκητοκτόνο** της **DOW AgroSciences**, με **προστατευτική** και ταυτόχρονα **θεραπευτική δράση ενάντια** σε σημαντικά **επιβλαβή παθογόνα** που πλήττουν τις καλλιέργειες των **Μηλοειδών**, των **Πυρηνοκάρπων** των **Ακρόδρυων**, της **Ελιάς**, του **Αμπελιού** και των **Κολοκυνθοειδών**.


### ▶ Κύρια χαρακτηριστικά

Το **Indar™ 5EW** διατίθεται στη **μορφή εναιωρήματος** (λάδι σε νερό, EW). **Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες** (ο διαλύτης του είναι το νερό), ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας κατά την εφαρμογή του και παρέχοντας ευκολία κατά το χειρισμό.

Το **Indar™ 5EW** κατά την εφαρμογή του προσκολλάται πολύ καλά στην κηρώδη φυτική επιφάνεια, προσφέροντας έτσι **υψηλή αντοχή στην έκπλυση** από τη βροχή. Στη συνέχεια, **διδισδύει** στο εσωτερικό του φυτού και κινείται **διασυστηματικά**, παρέχοντας **υψηλή προστασία**.

### ▶ Τρόπος δράσης

Το **Indar™ 5EW** περιέχει τη δραστική ουσία **fenbuconazole (5%)**. Η εν λόγω δραστική ανήκει στη **χημική ομάδα των τριαζολών** και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs, **FRAC Group: 3**).



## Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια - Στόχος	Δόση	Χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο	PHI	
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ</b> Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά-Nashi, Κυδωνιά, Μουσμουλιά (Χ.Η.Σ.)* ▶ Στόχος: Φουζικλάδιο	65-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, max. 100 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ.	Από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων, ως την ωρίμανση των καρπών.	4 ανά 7 ημέρες	28 ημέρες	
<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b> Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυssινιά ▶ Στόχος: Φαϊά Σήψη, Ωίδιο, Κυλινδροσπόριο κερασιάς, Σκωρίαση, Ανθράκωση	100-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, max. 150 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 50-150 λίτρα/στρ.	Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών, ως την ωρίμανση των καρπών.	4 ανά 10 ημέρες	κερασιά, βυssινιά: 5 ημέρες υπόλοιπα: 3 ημέρες	
<b>ΑΚΡΟΔΡΥΑ</b> Αμυγδαλιά, Φιστικιά (Χ.Η.Σ.)* ▶ Στόχος Αμυγδαλιά: Φαϊά Σήψη Φιστικιά: Σεπτόρια, Σκωρίαση, Βοτρουοσφαίρια	150-420 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, max. 150 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ. υγρού 35-100 λίτρα/στρ.	Με την έκπτυξη των οφθαλμών/ αρχή της άνθησης, ως το τέλος της άνθησης.	2 ανά 7 ημέρες	120 ημέρες	
<b>ΑΜΠΕΛΙ</b> (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) ▶ Στόχος: Ωίδιο	75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού, max. 75 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 100 λίτρα/στρ.	Πριν την άνθηση όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι την αλλαγή του χρώματος των ραγών, ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.	4 ανά 10-14 ημέρες	28 ημέρες	
<b>ΕΛΙΑ</b> ▶ Στόχος: Κυκλοκόνιο	150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού, max. 150 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 80-100 λίτρα/στρ.	Από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη).	1	Μη εφαρμοσμο. Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής.	
<b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</b> Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ) Πεπόνι (Υ), Καπούζι (Υ) ▶ Στόχος: Ωίδιο	100-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού, max. 100 κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.υγρού 40-100 λίτρα/στρ.	Με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	3 ανά 8 ημέρες	3 ημέρες	

## Τρόπος Ψεκασμού: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μικητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δε εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή. \*Χ.Η.Σ. (Χρήσεις ήσσονος σημασίας). Για τις χρήσεις αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.



# Indar™

## 5EW



### Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική προληπτική και θεραπευτική δράση ενάντια στα κύρια επιβλαβή παθογόνα.
- Ευρύ φάσμα δράσης.
- Μορφή τυποποίησης EW για ευκολία στη χρήση.
- Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής.
- Άριστη αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.
- Εφαρμογή και κατά την περίοδο της πλήρους άνθησης.
- Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
- Σημαντικό εργαλείο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας φρούτων και καρπών.
- Ιδανικό για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καλλιεργειών.

	<b>Indar™ 5EW</b>
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	60504 / 29-01-2016
Εγγυημένη σύνθεση	Fenbuconazole 5% (β/ο), Βοηθητικές ουσίες: 94,85% (β/β). Περιέχει Pestiflo 381. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μορφή σκευάσματος	Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)
 	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.</li><li>- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</li><li>- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</li><li>- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</li></ul>
<b>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</b> <p>Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>	

Κάτοχος της άδειας: DOW Agrosociences Export S.A.S.



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**  
ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής  
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr



K&N Efthymiadis

Δημιουργούμε φυτοπροστασία