

ΚΥΛΕΟ®

The weed twister

Glyphosate οξύ 24%
(χημική ομάδα φωσφονογλυκινών)
2,4-D οξύ 16%
(χημική ομάδα φαινοξυαλκανοϊκών)

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία 1: Glyphosate οξύ 24% β/ο (σε μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 32,4% β/ο)
Δραστική ουσία 2: 2,4-D οξύ: 16% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 69,52% β/β

Διασυστηματικό μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αργωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων), υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνεύετε σκόνη / εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προστατευτική γάντια κατά το χειρισμό και εφαρμογή του προϊόντος» «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος». «Σε περίπτωση επανεισοδού στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρομάνικη μπλούζα. Συνιστάται η χρήση γαντιών» «Να τηρείται μια απόσταση 5 μέτρων από κατοικημένες περιοχές. Να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50%».

Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. *Με αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους*). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάφρασης **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για εφαρμογή σε αγρούς μετά τη συγκομιδή, για καταστροφή της κακαμίας και για κατηγορία του εδάφους για σπορά. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στοχούς να αφήσετε μια: - αμείκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 75%, για τη δόση 400-500 κ.εκ./στρ. - αμείκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού κατά 50%, για τη δόση 300 κ.εκ./στρ.

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70058/25-11-2013

Κάτοχος της άδειας /Παρασκευαστής:
Nufarm GmbH & Co. KG,
St-Peter Strasse 25, 4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας /
Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

K&NE
EARTH MATTERS

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδοα.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:
5 λίτρα e

Προσοχή



Nufarm
Grow a better tomorrow

Καταργηθείσα και πρόσθετος δρόμος: Το KYLEO ® απορροφάται από τα φύλλα και τους τριφύλλους βλαστούς των ζιζανίων. Το Glyphosate παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το 2,4-D μετακινείται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, επηρεάζοντας την ανάπτυξη, τα αποθέματα θρεπτικών συστατικών και την κυτταρική διαίρεση.

Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	
		Κ.εκ. σκευασμ./στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού Λτ./στρέμμα
Άγριοι μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας	Ετήσια ζιζάνια* (αργωσιώδη και πλατύφυλλα)	200-300	20-40
Καταστροφή της καλαμιάς	Πολυετή ζιζάνια** (αργωσιώδη και πλατύφυλλα)	400-500	
Άγριοι πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά σιτηρών, μηδικής, σόγιας	Ετήσια* και Πολυετή** ζιζάνια (αργωσιώδη και πλατύφυλλα)	400-500	
Ακαλλιέργητες εκτάσεις Βιομηχανικά και Αστικά πάρκα Δρόμοι αστικών πάρκων Κατά μήκος σιδηροδρομικών γραμμών	Ετήσια* και Πολυετή** ζιζάνια (αργωσιώδη και πλατύφυλλα)	400-500	20-40
Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών	Υδροχαρή ζιζάνια (αργωσιώδη και πλατύφυλλα)	400-500	

(* **Ετήσια ζιζάνια:** Αγριοβρώμη (*Avena spp.*), Αλεπιπουρά (*Alopecurus myosuroides*), Ετήσια Πόα (*Poa spp.*), Ηρα (*Lolium spp.*), Σετάριας (*Setaria spp.*), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum*), Πολύκομο (*Polygonum spp.*), Ρανουγκούλος (*Ranunculus spp.*), Ραπανιά (*Raphanus raphanistrum*), Αγριόβικος (*Viola spp.*), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Πεντάνευρο (*Plantago spp.*).

(** **Πολυετή ζιζάνια:** Αγρόπυρο (*Agropyron repens*), Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Κύπερος (*Cyperus rotundus*), Αρτεμισία (*Artemisia vulgaris*), Σωχός (*Sanchois arvensis*), Λάπαθο (*Rumex spp.*), Κίρσο (*Cirsium arvense*), Αγριόροδο (*Taraxacum officinale*), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis*), Μεγάλη Περικοκλάδα (*Calystegia sepium*), Αλογοούρα (*Equisetum arvense*)

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ομοιόμορφος ψεκασμός των ζιζανίων με 20 – 40 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σπογγώδη του ψεκαστικού διαλύματος με γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (όπως π.χ. αμπέλι, αποπροφωρά δέντρα, κηπευτικά, κλπ). Χρησιμοποιείστε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκαστεί με πίεση μικρότερη από 2 atm (30 PSI) ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μειωμένης διάσπασης. **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στάδιο ζιζανίων:** Τα έτησια ζιζάνια ψεκάζονται όταν βρίσκονται κατά το στάδιο της ζωικής τους ανάπτυξης. Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται όταν βρίσκονται κοντά ή κατά την άνθησή τους, κατά η λίγο μετά από αυτή. Τα υδροχαρή ζιζάνια ψεκάζονται όταν βρίσκονται κοντά ή κατά την άνθησή τους.

Μείνιμος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.
Παρατηρήσεις: 1. Η εφαρμογή του να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό αποφεύγοντας την διάσπαση των σπογγωδών του ψεκαστικού διαλύματος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 2. Το εγώ της δόσης είναι ανάλογο του είδους των ζιζανίων. Για έτησια ζιζάνια χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση, ενώ για πολυετή η υψηλότερη. 3. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας (μεταξύ 8 και 25 °C) και με υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (οχι κάτω από 60%). 4. Να μην εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή σε διάστημα 3 ωρών. 5. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 6. Η εφαρμογή να γίνεται από δεν υπέρ βαρέων ή κατά στραγγιστικά κανάλια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Μη εφαρμοσίμο
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σιτηρά: 7 ημέρες, Μηδική και Μαύρο Σιτάρι: 30 ημέρες.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Αραβόσιτος: 15 ημέρες, Φασόλια και Μπιζέλια: 30 ημέρες, Πατάτες, Ζαχαρότευπλα και Ηλιανθός: 60 ημέρες.

Να μην εφαρμόζεται πριν τη σπορά ελαικοκράμβης και λαχανικών, εκτός αν η εφαρμογή πραγματοποιείται το φθινόπωρο της προηγούμενης χρονιάς.
Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και την κατεργασία του εδάφους για σπορά, να μεροαλείβεται διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα έτησια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

-τη πρόσδεση του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Σε περίπτωση εστιασμού: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε το γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε το γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το γιατρό.
Πληροφορίες για τον ιατρό: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το σκεύασμα του ψεκαστικού υγρού με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε σκάφορ ή ακαθάρτο νερό για τη διαλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τουλάχιστον 3 φορές με καθαρό νερό. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνιστάται η ανάμειξη του KYLEO ® με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείαις ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίζει: • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή των εναρμόνων ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στις δράστικές ουσίες glyphosate και 2,4-D. • Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή και με τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην πνευ στο νερό. **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του για τις ελλειψικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. **Οδηγίες για την ασφαλή αποφυγή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνονται τουλάχιστον 3 φορές με καθαρό ζεστό νερό (να νερό του ξεπλύματος να ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τριπύμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακύκλωση ενέργειας. **Συνδυαστική αποθήκευση χρονική διάρκειότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαριθμωτή συσκευασία, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από -5°C μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, σε χώρο δροσερό, ήλιο και καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.