

LiMCPA[®] Forte 50SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

mcpa 50%

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: mcpa οξύ 50% β/ο

(υπό μορφή άλατος Διμεθυλαμίνης 61,24%)

Βοηθητικές ουσίες: 52,42% β/β

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / ατμοκοντανώσεις σταγονιδίων / ατμούς / έκκεντρα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιεκτική σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση.

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος».

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αμέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 70166/21-07-2016

Παρασκευαστής σκευάσματος: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία
Κάτοχος της άδειας: NUFARM GmbH & Co KG,
St-Peter Strasse, 25-A-4021, Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



K&NE ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.Π.Ε. Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

0118

Περιεχόμενο: **5 λίτρα** e



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατορία και τρόπος δράσης: Το **Limca Forte** απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μερισματικούς ιστούς, όπου ανατρέφει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιπτώσεις και ασύμμετη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστρωτή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σικαλη, Τριτικήλε): Για την αντιμετώπιση πλατυφύλλων ζιζανίων εφαρμογή από το τέλος του αδεφάγματος έως την έναρξη του καλαμώματος, με ομοιομορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, με δόση: 160-200 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **ΠΥΖΙ:** Για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή από το τέλος του αδεφάγματος έως την έναρξη του καλαμώματος, με ομοιομορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, με δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή όταν το φυτό βρίσκεται στο στάδιο των 4 φύλλων, με ομοιομορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, με δόση: 160 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μαντανιάρια, Λεμονιά, Γκρέιφ φρουτ, Κίτριο), ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Κασιόνη, Ροδιόκαλη, Καρύδι), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλάδι, Κυδωνιά), ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΚΑΡΦΟΧΩΡΤΟ, ΒΕΚΟΤΟΠΙΟ, ΒΕΚΟΤΟΠΙΟ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΟ, ΚΕΡΣΙΝΑ, ΔΑΜΑΣΚΙΝΟ), ΕΛΙΑ: Για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων εφαρμογή με ομοιομορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης με δόση: 240 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. **Βοσκότοπι αγρωστωδών / Λιβάδια αγρωστωδών:** Για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων ανοιξιατική εφαρμογή με ομοιομορφο ψεκασμό του φυλλώματος των ζιζανίων, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο και στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης με δόση: 240-320 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-60 λίτρα/στρ.

Παρατηρήσεις: 1. Να μην εφαρμόζεται όταν έχουν πέσει ελιές στο έδαφος. 2. Καταπολιεόμενα ζιζάνια: **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Άγριο γογγύλι (*Brassica napus*), Βλήθο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*), Γεράνια (*Geranium spp.*), Βούρλο μικρό (*Juncus bufonius*), Βωδεδάκνυ (Lamium amplexicaule), Ζωχός (*Sonchus arvensis*), Κατιγόχορτο (*Fumaria officinalis*), Καρδωμάνη (*Cardamine hirsuta*), Καπέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Λαμίο πορφυρό (*Lamium purpureum*), Λουβουδιό (*Chenopodium album*), Λουβουδιό πολυσπερμό (*Chenopodium polysperum*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Μυρώνι (*Scandix pecten-venensis*), Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas*), Πεντάνευρα (*Plantago spp.*), Ρόκα (*Eruca vesicaria*), Σπέργουλα (*Spergula arvensis*).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριοτομάτι (*Solanum nigrum*), Αγριοδάκο (*Taraxacum officinale*), Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis*), Ανθεμίδια (*Anthemis arvensis*), Βερόνικες (*Veronica spp.*), Κεράσινο (*Cerastium spp.*), Λάπαθα (*Rumex spp.*), Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Περίκοιλάδα (*Convolvulus arvensis*), Πικραλίδα (*Crepis capillaris*), Πολυκόμιο (*Polygonum aviculare*), Ρανδώγκουλι (*Ranunculus arvensis* & *Ranunculus repens*), Ρατανιά (*Raphanus raphanistrum*), Χαμομήλι (*Matricaria spp.*).

Μείζονος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιομορπος μεταφωτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείται μικρό τύπου σκούπας και ψεκαστές με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (50 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αδειάζουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και τη ρίχνουμε στο ψεκαστικό αδειανότα συνεχώς. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αδειάευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζει τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Επιπλέον αφοσιαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Πριν το έναρξη χρησιμοποιήστε ξεπλύνετε το πάδι με άφθονο καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Να εφαρμόζεται όταν επικρατούν θερμοκρασίες μεταξύ 12°C και 20 °C. Καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν οι θερμοκρασίες αυτές διατηρούνται για τις επόμενες 2-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.
- Για την αποφυγή της διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργιών, όπως παρατεταμένη έληραση, παγωνιά, νεροκαρτήματα, ιαχούρι ψυχρού ανέμου κ.α.
- Χρησιμοποιείτε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο MCPA.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του. Κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Ελέγχετε την αναπνοή και εφόσον είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Αν ο ασθενής είναι αναίσθητος, τοποθετήστε τον στο πάδι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα ημιυψωμένα. Σε περίπτωση επινούσης: Μετακινήστε τον ασθενή από τον χώρο της έκθεσης σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής με το ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα επιποσμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα. Σε περίπτωση επαφής με ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήτε τίποτα δια τα στόματα. Μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση ατυχημάτων ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Οδηγίες για τον γιατρό: Συνιστάται αναγκαστική αλκαλική διούρηση. Ελέγχετε τη λειτουργία των νεφρών.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Στις περιπτώσεις αποτυχίας των ετήσιων καλλιεργειών είναι δυνατή η επασπορά μετά από 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην περιοχή που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος πριν στεγνώσει το προϊόν. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) εβδομάδες τουλάχιστον.

Στοιχία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) / Σιτάρι, Αραβόσιτος, Βοσκότοπι αγρωστωδών / Λιβάδια αγρωστωδών: 15 ημέρες. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες: Μ.Ε. (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής). **Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του παραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίες ξεπλύνονται από πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριψύμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθιούνται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

0118

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε επί της συσκευασίας

