



JOUST®

Η ασπίδα προστασίας ενάντια στους μύκητες

- Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με βάση τη δραστική ουσία **prothioconazole (25%)** της ομάδας των DMIs, με **προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων** σε σιτηρά και ελαιοκράμβη.
- Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 στις μεμβράνες των μυκήτων επιτυγχάνοντας τον έλεγχο της ασθένειας.
- Έχει κυρίως προληπτική δράση αλλά παρουσιάζει και διασυστηματική κίνηση στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπεταλική διασυστηματική κίνηση).

- ▶ **Υψηλή αποτελεσματικότητα.**
- ▶ **Δράση μεγάλης διάρκειας.**
- ▶ **Μη φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις εγκεκριμένες καλλιέργειες στις συνιστώμενες δόσεις σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.**
- ▶ **Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράμματα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας.**



JOUST®

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

| Πεδίο εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο /Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες. | PHI (ημέρες) |
|---|--|--------------------|-----------------------------|---|--|--------------|
| | | κ.εκ. σκ./στρ. | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ. | | | |
| Μαλακό Σιτάρι¹ (Χειμερινό & Ανοιξιότιχο) | Σεπτορίωση, Καστανή Σκωρίαση, Κίτρινη Σκωρίαση, Ωίδιο, Φουζαρίωση | 60-80 | 10-40 | Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης. | 2/14-21 ημέρες | 35 |
| Σκληρό Σιτάρι | Σεπτορίωση, Ωίδιο | | | | | |
| Τρικήαλε (Χειμερινό & Ανοιξιότιχο) | Σεπτορίωση, Καστανή Σκωρίαση, Ρυγχοσπορίωση, Κίτρινη Σκωρίαση, Ωίδιο, Φουζαρίωση | | | | | |
| Σίκαλη (Χειμερινή & Ανοιξιότιχη) | Σεπτορίωση, Ρυγχοσπορίωση, Σκωρίαση Φύλλων, Ωίδιο | 60 | 10-40 | Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης. | | |
| Κριθάρι (Χειμερινό & Ανοιξιότιχο) | Ραμουλάρια, Σκωρίαση, Ρυγχοσπορίωση, Ελμινθοσπορίωση/ Δικτυωτή κηλιδωση | | | | | |
| Βρώμη (Χειμερινή & Ανοιξιότιχη) | Σκωρίαση Φύλλων | | | | | |
| Ελαιοκράμβη (Χειμερινή) | Σκληρωτίτια, Ωίδιο, Αλτερνάρια | 60-70 | 10-40 | Δύο εφαρμογές (φθινοπωρινή και ανοιξιότιχη): Η 1η φθινοπωρινή εφαρμογή από το στάδιο του 4ου φύλλου έως το 8ο φύλλο και η 2η ανοιξιότιχη εφαρμογή από το στάδιο της έναρξης επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι το τέλος της άνθησης. | 2/90 ημέρες | 56 |
| | | | | Ή δύο εφαρμογές (ανοιξιότιχες): Εφαρμογή από το στάδιο της έναρξης επιμήκυνσης του βλαστού μέχρι το τέλος της άνθησης. | 2/14-28 ημέρες | |

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Παρατηρήσεις: 1. Η χρήση στο μαλακό σιτάρι περιλαμβάνει τις χρήσεις στις καλλιέργειες Σπέλτα, Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι και Tritordeum.

| | |
|---|--|
| | JOUST |
| Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) | 61118/ 31-03-2023 |
| Δραστική ουσία | Prothioconazole 25% β/ο |
| Μορφή σκευάσματος | Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) |
| ΠΡΟΣΟΧΗ | <ul style="list-style-type: none"> - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. |

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομές: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr

K&N Efthymiadis



Καθδιέρχουμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023