

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστάμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 24 ώρες. Το pH του νερού δεν πρέπει να είναι αλκαλικό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε δυο φορές το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά: **Δ.Ε. (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης κατά την εφαρμογή).**

- Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμύγδα, 3 ημέρες.

- Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθα, Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου): **1 ημέρα.**

- Μαρούλι & άλλα σαλατικά, Σπανάκι & παρεμφερέ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου): **2 ημέρες.**

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια. •Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά και ολόσωμο φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση. •Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχτή του προϊόντος ή την ετικέτα. •Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. •Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα, με φυτική κάλυψη:

• **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε καλλιέργειες φυλλωδών και καρποφόρων λαχανικών.

• **10 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε αμύγδα.

• **20 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε ροδακινιά - νεκταρινιά μετά την ανθοφορία.

• **30 μέτρων** σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε πυρηνόκαρπα πριν την άνθηση.

• Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, αφήστε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη, στα πυρηνόκαρπα. •Επιπλέον για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνονται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Ημερομηνία παραγωγής/ Αριθμός παρτίδας: Βλέπε φιάλη



NATUR BREAKER

4 EC

Pyrethrins
(Χημική ομάδα Πυρεθρινοειδών)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyrethrins 4% β/ο
Βοηθ. ουσίες 91,11% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- Περιέχει Pyrethrins. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.

- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 750 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας:
CERTIS BELCHIM B.V.
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14596/02-02-2017

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ



Το **NATUR BREAKER** είναι εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών για την αντιμετώπιση μυζητικών εντόμων. Χαρακτηρίζεται από ταχεία και σύντομη διάρκεια δράσης και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά στην εποχή απελευθέρωσης ωφέλιμων εντόμων. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το θάνατό τους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά): Για **αφίδες** (*Myzus persicae*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος πριν την άνθηση, με την έναρξη της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): Για **αφίδες** (*Myzus persicae*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα / στρέμμα.

Αμύγδα (Επιπράτεια και ονοποποίηση σταφύλια): Για **τζιτζικιά** (*Zygina rhamni*, *Scaphoideus titanus*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος μετά την άνθηση στο στάδιο μικρών καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για **αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα / στρέμμα.

Αγγούρι, Κολοκύθη (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για **αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα / στρέμμα.

Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για **αλευρώδεις** (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής και πριν την απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα / στρέμμα.

Μαρούλι & άλλα σαλατικά, (σκαρόλα ή πικριδα, Αντίδι, Ρόκα, Φύλλα και βλαστοί του είδους brassica) Σπανάκι, Σέσκουλα, & παρεμφερέ (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για **αφίδες** (*Aphis gossypii*, *Nasonovia ribisnigri*, *Aphis fabae*) με δόση 75-90 κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (Μέγιστο 60 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα). Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 65-80 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Για όλες τις καλλιέργειες: 2 / 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η δόση / 100 λίτρα νερού θα πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπτή δόση/στρ.

2. Οι εφαρμογές να γίνονται στις δροσερές ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

4. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής από αλευρώδεις.

5. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

• Να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

• Ταξινόμηση κατά HRAC: Group A/3.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.



102