

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: «Φυλάσσειται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. «Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Μα φορέτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. «Μα φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανόμιξης/φθέρωσης». «Μα φοράτε γάντια / προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής». «Σε περίπτωση επικοινωνίας στην καλλιέργεια να φορέτε γάντια, μακριά παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο». «Μη ρυπαίνετε το νερό με το αέρας/σημ ή τη συσκευασία του.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκευθείτε γιατρό αν νιώθετε διαβόηση. Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα και καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του παραβλαστική συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.



NISSORUN® 25 SC

**hexythiazox
(δυσκό καρβαζιμίδιο)**

Πυκνό εναιώρημα (SC)

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ
Εγγυημένη σύνθεση:
hexythiazox: 25% β/β
βοηθ. ουσίες: 76,30% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσειται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 100 κ.εκ.

Κόστος της έγκρισης: Nisso Chemical Europe GmbH,
Berliner Allee 42, 40212 Duesseldorf, Γερμανία
 **Υπευθύνος για την τελική έμβαση στην αγορά, Εργαστόσιο συσκευασίας, Διανομή:**
K&N ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σινδόχ,
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@ethymias.gr
Αριθμ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 2188 / 21-12-2015



Αρκετάκονο επαφής και στομάχου με δράση ωκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επιπτώσεις
- Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
«Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση»



190x43

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Μηλιά, Αχλαδιά: Για τετράνυχους (*Ranonychus ulmi*). Ψεκασμός με την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα, ψεκ. υγρό (μέγιστο 20 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι (ονοποθήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Ψεκασμός από την έναρξη της προσβολής από την έκπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτρα, ψεκ. υγρό (μέγιστο 20 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (θερμοκλίτη): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 30 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτ. ψεκ. υγρό (μέγιστο 30 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτ. ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκλίτη): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-32 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτ. ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκλίτη): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-32 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτ. ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (υπαίθρου): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ.σκευάσματος/100 λίτ. ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Φρούδες (υπαίθρου και θερμοκλίτη): Για τετράνυχους (*Tetranychus ulicae*). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως τη συγκομιδή. Δόση: 20-30 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτ. ψεκ. υγρό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια/ περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών: Για Αμπέλι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 ημέρες. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες μία (1) εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμιαίου.
2. Επειδή ο δρυν προστατικό έχει μακρά τοξικολογική διάρκεια δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μία εφαρμογή τον χρόνο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείται καλά πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευσή.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Επιπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται: -Εφαρμογή όλων των μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένων Διαχειρίσιμων ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των ακάρεων σε χαμηλά επίπεδα. -Επιμετρήσεις όταν είναι απαραίτητο και στον κατάλληλο χρόνο, σχετιζόμενες στα πιο ευαίσθητα βιολογικά στάδια των ακάρεων, με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα έντομα. -Εφαρμογή του **NISSORUN 25 SC** στις συγκεκριμένες δόσεις και με πλήρη κάλυψη των φυλλώματων των φυτών. -Εναλλαγή του σκευάσματος με ακαρεοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. -Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να ενισπιαστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενταπιόνθεται σε σημεία σκόουλγης, για ανάκύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

***Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:** Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς (πρώιμες εφαρμογές) να αφήνεται μια απεκαστή ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή **20, 15 ή 10 μέτρα** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%, 75% ή 90%**, αντίστοιχα. Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς (όθιμες εφαρμογές) να αφήνεται μια απεκαστή ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή **15, 10 ή 5 μέτρα** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **5 0% ή 7 5% ή 90%**, αντίστοιχα. Στην καλλιέργεια του αμπελλιού να αφήνεται μια απεκαστή ζώνη προστασίας **10 μέτρων ή 5 μέτρων** σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**. - Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες να αφήνεται μια απεκαστή ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή να χρησιμοποιείται ακροφύσια μείωσης **50%** της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 28 ημέρες, Αμπέλι: 21 ημέρες, Τομάτες (Υ&Θ), Πιπεριές (Θ), Μελιτζάνες (Υ&Θ), Αγγουρί (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Φρούδες (Υ & Θ): 3 ημέρες