

# PRAXIM SC

## Metobromuron 50% (Ομάδα Φαινυλοουριών)

### Συμπυκνωμένο Ελαιώρημα (SC)

Εγγημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Metobromuron 50% β/ο (41,94% β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 58,06 % β/β

UFI: KQ46-80HS-5001-055F

**Εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες.**

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Υποπνο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες σοβαρές, δυσμενείς επιπτώσεις.
- Πιέριεγι 1,2-βενζισοθιαζολιν-3(2H)-όνη (metobromuron). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα**

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.Stadsplateau 16,  
3521 AZ Utrecht, PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

**ZIZANIOKTONO**



0124

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ) : 70282 / 07.05.2018

# PRAXIM SC

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Εκλεκτικό προφυτρωτικό (ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο επίσημων πλατυφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε διάφορες καλλιέργειες. Η δ.α. μελοβιονομύλη απορροβάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από τα φύλλα. Αναστέλλει την φωτοσύνθεση με αποτέλεσμα την καταστροφή των ζιζανίων.

## ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**ΠΑΤΑΤΑ:** Μία (1) εφαρμογή **προφυτρωτική** με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων και οριζώντων επίσημων αγρωστωδών ζιζανίων, με max δόση: 400 κ.ε. σκευάσματος/στρ. (ή 1334-2000 κ.ε. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού).

**ΗΛΙΑΘΟΣ, ΣΟΓΙΑ:** Μία (1) εφαρμογή **προφυτρωτική** με καθολικό ψεκασμό της επιφάνειας του εδάφους για την αντιμετώπιση πλατυφυλλων και οριζώντων επίσημων αγρωστωδών ζιζανίων, με δόση: 200-300<sup>QI</sup> κ.ε. σκευάσματος/στρ.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-30 λίτρα/στρ.

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το PRAXIM πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εμφάνιση των ζιζανίων. Η δραστηριότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

2. Η εδαφική υγρασία ευνοεί τη δραστηριότητα του προϊόντος. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι στο ριγνό του.

3. Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους. Σε αμιλόδες εδάφους (ποσοστό της άμμου μεγαλύτερο από 65%) ή σε εδάφους με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη από 3%, να μειωθεί τη δόση σε 200 κ.ε./στρ. Προβλήματα εκλεκτικότητας μπορούν να εμφανιστούν αν αυτά τα εδάφη σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης μετά την εφαρμογή.

4. Ψεκάστε σε κατάλληλη προετοιμασμένο έδαφος.

## ΠΑΤΑΤΑ:

**Καταπολεμούμενα - εναισθητά ζιζάνια:** *Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima* (Τεύτλο), *Bidens tripartita* (Αγριοκαπέφες), *Διδόδο* του *trimeris*<sup>QI</sup>, *Chenopodium album* (Λουβουδιό), *Digitaria sanguinalis* (Αιμάτοχορτο), *Diploklax erucoides*, *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα), *Fallolria* sp. (Πολύγωνο), *Fallolria conovulvulus* (Άγριο Φυτόμυρο - Αναρριχώμενο πολύγωνο), *Lolium rigidum* (Λεπτή γραμμή), *Matricaria chamomilla* (Χαμομήλι), *Poa annua* (Κοινή πύο), *Polygonum aviculare* (Πολυκόμμη), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα-γλυστρίδα), *Reseda phlueyema*, *Senecio vulgaris* (Μαριτάκος), *Sinapis arvensis* (Βρούβα-λαχάνο - άγριο σινάμι), *Solanum nigrum* (Στύφνος-αγριοσταμάς), *Sonchus arvensis* (Πολυέτης λυχνός).

**Καταπολεμούμενα - Μερτίως εναισθητά ζιζάνια:** *Aethusa cynapium* (Αιθούσα), *Amaranthus albus* (Άσπρο βλήτο), *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ βλήτο), *Convolvulus arvensis* (Περιπόκοδα), *Diploklax erucoides*, *Euphorbia chamaesyce* (Χαμοκίαια), *Fumararia officinalis* (Καμυόχορτο), *Mercurialis annua* (Σκαρολάχανο), *Setaria adhaerens* (Στάριος).

## ΣΟΓΙΑ-ΗΛΙΑΘΟΣ:

**Καταπολεμούμενα - εναισθητά ζιζάνια:** *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ βλήτο), *Centaurea* sp. (Κεράτωση), *Chenopodium album* (Λουβουδιό), *Digitaria sanguinalis* (Αιμάτοχορτο), *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα), *Polygonum*

*aviculare* (Πολυκόμμη), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα-γλυστρίδα), *Solanum nigrum* (Στύφνος-αγριοσταμάς).

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος ψεκασμός σε κατάλληλη προετοιμασμένο έδαφος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την συστημιακή δόση του σκευάσματος αναδύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό με συνεχόμενη ανάδευση κατά την διάρκεια του ψεκασμού. Μην προετοιμάζετε περισσότερη ποσότητα ψεκαστικού υγρού από την απαραίτητη.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Καθαρίστε με τριπλό ζέπλαιο αμέσως μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να έχουν απομακρυνθεί.

**Συνδυαστικότητα:** Το PRAXIM δεν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προϊόντα.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Μην φύτευετε φυλλώδη ψωχανθή ή σπύρα σε λιγότερο από 120 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση που φυτεύονται ριζωματώδεις καλλιέργειες σε λιγότερο από 120 ημέρες από τη τελευταία εφαρμογή του σκευάσματος, μην χρησιμοποιείτε τα εν λόγω καλλιέργειες για ζωοτροφή.

**Διαχείριση Ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων όπως χειρωνακτικά, μηχανική μέθοδος, κ.λ.π., όπου αυτό είναι δυνατό.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προετοιμασμένης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση σποράς της καλλιέργειας όπου εφαρμόστηκε το σκευάσμα σε δόση 200 – 300 κ.ε./στρ. μπορούν να αποβληθούν/φυτευτούν: πατάτα μετά από επιφανειακή κατεργασία του εδάφους ή καλαμπόκι, φασόλια, μπιζελιά, κρεμμύτα, μετά από βαθύ όργωμα.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε χωράφι όπου εφαρμόστηκε το σκευάσμα σε δόση 200 – 300 κ.ε./στρ θα πρέπει να γίνει βαθύ όργωμα πριν την σπορά/φύτευση με τις ακόλουθες καλλιέργειες: σταυρανή, τεύτλο.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα:** 48 ώρες.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια ενδυσάμια ατομικής προστασίας. Διάθεση περιεχομένου / περίεκτη σύμφωνα με τη εθνική νομοθεσία. «Φοράτε γάντια, ολόκληρη προστατευτική ενδυσάμια και μπότες κατά την αναμίση/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Κατά την επανεισδοσ στον αγρό μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόκληρη φόρμα εργασίας.»

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΑΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλείτε έμετο όταν ο πάθοντος έχει χάσει τη συνείδηση. Ξεπλύνετε γαλοστασίο το στόμα με νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΝΗΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εφάπτης με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. **Σε περίπτωση εφάπτης με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ενδύματα και πλύντε το δέρμα με σαπούνι και άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Το μελοβιονομύλη μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό μελοβιοσφαιρίνης. Αντιδοτό: Κιανό το μεβουλιόνη. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΑΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Μη ρυτύνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.** Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από ούλες ανοικτών/κλειστών ή περιφερειακών οδών. Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς, αφήστε μια φυτική ζώνη ανάσπασης:

-20 μέτρων για την καλλιέργεια της πατάτας  
-10 μέτρων για τις καλλιέργειες σόγιας και ηλιανθού  
Για να προστατέψετε φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αμέσως ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες της πατάτας, της σόγιας και του ηλιανθού.

UFI: KQ46-80HS-5001-055F

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας:** Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):**

**Όλες οι καλλιέργειες:** Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος (προφυτρωτική).

**Συνθήκες απόκτησης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσεται στην αρχική του παραβιασμένη συσκευασία, σε συνικόνες συνθήκες θερμοκρασίας.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ζέπλαιο (τα νερά του ζέπλαιου ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με ρύπτωμα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθείνουν σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ημερ. παραγωγής:** Βλέπε  
στη τσάντα  
**Αριθμός παρτίδας:** συσκευασίας

bar code