K&NE EARTH MATTERS

PROFIL® EXTRA 5 SL

acetamiprid
(χημική ομάδα νεονικοτινοειδή)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Acetamiprid: 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 95,28% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **4 λίτρα**

Κάτοχος της έγκρισης:
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH,
Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Γερμανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας / Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά-
Διανομή:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
Βι.Πε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος | Τηλ.: 2310 568656 | e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑ): 14620 / 15-09-2017

Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το **PROFIL Extra 5 SL** είναι εντομοκτόνο της ομάδας των νεονικοτινοειδών.
Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, αλευρώδεις και εναντίον ορισμένων λεπιδοπτέρων, Κολεοπτέρων, Διπτέρων και Θριπών. Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικό ρουχισμό/ κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή. •"Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.»

- **Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.** (Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:
- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **με** βλάστηση **10 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες: τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, κολοκυνθοειδή, λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ψυχανθή, άσπρια, αγκινάρα, πατάτα, ελαιοκράμβη, καπνό, φυτώρια αμπελιού, καλλωπιστικά.
- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών, του Αμπελιού, των Σμέουρων και των Βατόμουρων.
- Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών και των Πυρηνόκαρπων.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετέ τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας. Να ξεπλυθείτε καλά, με νερό και σαπούνι και τέλος πάλι με νερό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα. Μην προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Χρησιμοποιείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

PROFIL® EXTRA 5 SL

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρείπ φρουτ, Κιτριά, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Κουμ-κουάτ, Φράπτα): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Βρωμούσες, Κοκκοειδή, Μύγα Μεσογείου και Φυλλοκοίλιστες με 100-150 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Για Τζιτζικάκια με 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μούσμουλα): Για Αφίδες, Μηλολάνθη και Μύγα Μεσογείου με 100-150 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Για Ψύλλες (ενήλικα), Φυλλορύκτες, Κηκιδόμυγες, Τζιτζικάκια, Βρωμούσες και Ανθονόμο με 100 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βυσσινιά, Κερασιά): Για Αφίδες, Μύγα Μεσογείου, Ραγολέτη κερασιάς, Δροσόφιλα και Φυλλοδέτες με 130-200 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Για Φυλλορύκτες, Τζιτζικάκια και Βρωμούσες με 100 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για Κοκκοειδή, Μύγα Μεσογείου, Δροσόφιλα, Φυλλοξήρα αμπέλου, Χρυσοκάνθαρο, Αφίδες και Θρίπες (εκτός από *F. occidentalis*) με 200 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Για Φυλλορύκτες και Τζιτζικάκια με 150 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από τα πρώτα κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.

Σμέουρα, Βατόμουρα: Για Αφίδες, Δροσόφιλα, Τζιτζικάκια και Ανθονόμο με 180 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 180 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το άνθισμα όπου οι βλαστοί έχουν το 90% του τελικού μήκους τους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες, Δρομάφο, Καλόκορη, Βρωμούσες, Τζιτζικάκια και Λυριόμυζα με 200-300 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Για Πυραλίδα πιπεριάς με 160-250 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 160 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του πρώτου κλειστού άνθους μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμο φλοιός): Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ) & Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Υ+Θ): Για Αφίδες και Αλευρώδεις με 200-300 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση του 5ου πλάγιου βλαστού μέχρι την ωρίμανση του 70% των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Αγκινάρα: Για Αφίδες με 150-250 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5ο πραγματικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Ανθοκράμβες (Μπρόκολο, Κουνουπίδι), **Κεφαλωτές κράμβες (εκτός από λαχανάκια Βρυξελλών)** (Λάχανο, Λάχανο σαβόι, Κόκκινο λάχανο, Λευκό λάχανο): Για Αφίδες, Βρωμούσες και Κολεόπτερα (Άλτης) με 160-250 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 160 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 2ο πραγματικό φύλλο μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εδώδιμου μέρους. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Ψυχανθή: Φασολάκια πράσινα, Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό), Αρακάς, Μπιζέλια: Για Αφίδες, Θρίπες και Φυλλορύκτες με 160-250 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 160 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λοβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Οσπρια: Φασόλια (ξηρά), Ρεβίθια, Φακές, Κουκιά, Φάβα: Για Αφίδες, Θρίπες και Φυλλορύκτες με 160-250 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 160 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που οι λοβοί αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα: Για Αφίδες, Δρομάφο και Βρωμούσες με 150-200 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 130 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5ο φύλλο του κύριου βλαστού μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των κονδύλων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι: Για Αφίδες και Καφέ Βρωμούσα (χρήση ήρσονος σημασίας)* με 150-200 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 130 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο φύλλο μέχρι το στάδιο που το 90% των καρυδίων αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα / στρέμμα.

Ελαιοκράμβη: Για Αφίδες, Βρωμούσες, Άλτης και Κολεόπτερα με 150-200 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 130 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο φύλλο μέχρι το στάδιο που το 50% των λοβών αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60 λίτρα / στρέμμα.

Μπδικό: Για Αφίδες, Άπιο και Γωνιόκτενα με μέγιστη δόση 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο πραγματικό φύλλο μέχρι πριν το άνοιγμα των ανθέων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-80 λίτρα / στρέμμα.

Καπνός: Για Αφίδες και Άλτη με 200-300 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 9ο πραγματικό φύλλο μέχρι το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες, Βρωμούσες, Τζιτζικάκια και Λυριόμυζα με 200-300 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150-200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5ο πραγματικό φύλλο. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Αμπέλι (φυτώρια): Για Αφίδες, Φυλλοξήρα αμπέλου, Τζιτζικάκια, Κοκκοειδή και Φυλλοκοίλιστες με 200-300 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150-200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 5ο πραγματικό φύλλο. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο και μη εδώδιμο φλοιό), Λάχανα και Κράμβες, Μαρούλι και άλλα Λαχανικά, Ψυχανθή, Όσπρια, Αγκινάρα, Ελαιοκράμβη κ.α.: Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες, Βρωμούσες, Άλτη, Τζιτζικάκια και Φυλλορύκτες με 200-300 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (150-200 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμού φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών:
- Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, Καπνός: **1** εφαρμογή.
- Σμέουρα, Βατόμουρα: **2** εφαρμογές ανά **20 ημέρες.**
- Αγκινάρα, Πατάτα, **Ανθοκράμβες** (Μπρόκολο, Κουνουπίδι), **Κεφαλωτές κράμβες (εκτός από λαχανάκια Βρυξελλών)** (Λάχανο, Λάχανο σαβόι, Κόκκινο λάχανο, Λευκό λάχανο), Μηδική: **2** εφαρμογές ανά **25 ημέρες.**
- Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Κολοκυνθοειδή: Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ), Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες), Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ), Αμπέλι (φυτώρια), Καλλιέργειες για σποροπαραγωγή: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο και μη εδώδιμο φλοιό). Λάχανα και Κράμβες, Μαρούλι και άλλα Λαχανικά, Ψυχανθή, Όσπρια, Αγκινάρα, Ελαιοκράμβη κ.α.: **2** εφαρμογές ανά **25-28 ημέρες.**
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Λεμονιά, Γκρείπ φρουτ, Κιτριά, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Κουμ-κουάτ, Φράπτα), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μούσμουλα), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βυσσινιά, Κερασιά): **2** εφαρμογές ανά **30 ημέρες.**
- Ψυχανθή: Φασολάκια πράσινα, Φασόλια (φρέσκα με λοβό και χωρίς λοβό), Αρακάς, Μπιζέλια, Όσπρια: Φασόλια (ξηρά), Ρεβίθια, Φακές, Κουκιά, Φάβα: **2** εφαρμογές ανά **30-45 ημέρες.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2) Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της.
3) Απαγορεύεται η χρήση κατά την ανθοφορία.
4) Στις καλλιέργειες βαμβάκι, ελαιοκράμβη και καπνός επιτρέπεται μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο. Στις υπόλοιπες καλλιέργειες μην υπερβαίνετε τις 2 εφαρμογές ετησίως.

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην Καφέ Βρωμούσα του Βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία του σκευάσματος πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Σε περίπτωση μείγματος με άλλα σκευάσματα που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες πρέπει να γίνεται δοκιμαστικός ψεκασμός σε μικρό τμήμα του αγρού πριν τη χρήση σε ευρεία κλίμακα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να αποφεύγεται η επανείσοδος μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή αμέσως μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά προστατευτικό ρουχισμό (γάντια, φόρμα εργασίας και κατάλληλα υποδήματα).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών καλλωπιστικών φυτών συνιστάται πριν τον ψεκασμό της καλλιέργειας να γίνει δοκιμή σε μικρό τμήμα αυτής.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: 1. Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο. 2. Να αποφεύγετε την χρήση του σκευάσματος σε καλλιέργειες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικοτινοειδή σκευάσματα, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. 3. Να γίνεται εναλλαγή του σκευάσματος με άλλα σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα νεονικοτινοειδή.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των ωφέλιμων αρθρόποδων: 1. Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του σκευάσματος, η εξαπόλυση βομβίνων (για επικονίαση των ανθέων) ή/και αρπακτικών ακάρεων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φύλλων. 2. Η εξαπόλυση των ωμενόπτερων παρασιτοειδών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. 3. Η εξαπόλυση του αρπακτικού *Orius* θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. 4. Επιβάλλεται η διατήρηση αψέκαστης ζώνης δέντρων εσπεριδοειδών σε ποσοστό 5% για τη προστασία του ωφέλιμου εντόμου *C. noaki*.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Κολοκυνθοειδή με μη εδώδιμο φλοιό, Ανθοκράμβες (Μπρόκολο, Κουνουπίδι), Κεφαλωτές κράμβες (εκτός από λαχανάκια Βρυξελλών); (Λάχανο, Κόκκινο λάχανο, Λάχανο Σαβόι, Λευκό λάχανο), Ψυχανθή, Όσπρια, Πατάτα, Βαμβάκι, Μηδική, Καπνός: **14 ημέρες**
Σμέουρα, Βατόμουρα, Αγκινάρα: **7 ημέρες**
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες: **7 ημέρες** (Υπαίθρου), **3 ημέρες** (Θερμοκηπίου).
Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο φλοιό): **7 ημέρες** (Υπαίθρου), **3 ημέρες** (Θερμοκηπίου).
Ελαιοκράμβη: **34 ημέρες.**

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

1219