



PROFIL® 20 SG

acetamiprid ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

(χημική ομάδα νεονικωτινοειδή)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Acetamiprid 20% β/β

Βοηθ. ουσίες 79,85% β/β

UFI: GENP-WX9F-JJ61-HR0F

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **10 γραμμ.**

Κάτοχος της έγκρισης:
NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH,
Berliner Allee 42, 402012 Düsseldorf, Γερμανία

Nisso

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:
K&N EYΘYΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΠΠΕ.Α., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ): 14139/22-6-2006



0525

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια μέσα αποικμής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Σε περίπτωση επανεπίστροφου στην καλλιέργεια μετά το ψεκασμό, φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.**

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μ** μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για τους οπωρώνες.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μ** από μη-καλλιερήσιμες εκτάσεις για οπωρώνες εσπεριδοειδών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΝΤΗΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό, σε περίπτωση αδιαθεσίας. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και παπούτσια και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI: GENP-WX9F-JJ61-HR0F

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται triple ζεπάκιμα (τα νερά του ξεπάκιματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με πρότμη ή σχίσμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής: για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χύμο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στο ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Αναλ μέρος του κουτιού

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΕΣ



0525

Κατηγορία - Τρόπος δράσης: Το Profil 20 SG είναι εντομοκτόνο της ομάδας των νεονικωτινοειδών. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως μυητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις και ορισμένα Λεπιδοπτάρα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citri). Δρα δευτερευόντως τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Φυτώρια Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά): Για αφίδες και για φυλλοκνίστη με max δόση 25 γρ. σκευάσμα /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 15-25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής για την αντιμετώπιση των αφίδων και ψεκασμοί κυρίως στην νέα βλάστηση το καλοκαίρι με την έναρξη της προσβολής για την αντιμετώπιση του φυλλοκνίστη.

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γρέιπ φρουτ, Κίτρι): Για αφίδες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή max 50 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 200 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής χωρίς την άνοξη κατά την περίοδο από την διάκωση των οφθαλμών έως την πτώση των πετάλων.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδι): Για αφίδες και για φυλλορύκτες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή max 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, Νεκταρινιά): Για αφίδες και για φυλλορύκτες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή max 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Κεράσια: Για αφίδες και για φυλλορύκτες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή 25-37,5 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Δαμασκηνιά: Για αφίδες και για φυλλορύκτες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα /100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ή max 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (Υπαίθρου): Για αφίδες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Τομάτες (Θερμοκηπίου): Για αφίδες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Μελιτζάνες (Θερμοκηπίου): Για αφίδες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και για αλευρώδεις με δόση 35-40 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός): Πεπόνι (Υπαίθρου): Για αφίδες με δόση 12,5-15 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και για αλευρώδεις με δόση 20-25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-60 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι (Θερμοκηπίου): Για αφίδες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100-170 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Βαμβάκι: Για αφίδες με δόση 20-25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα, για αλευρώδεις και για Καφέ Βρωμιά (χρήση ήσσονος σημασίας) με δόση 25-30 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Καπνός: Για αφίδες και για αλευρώδεις με δόση 25-30 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Πατάτα: Για δορυφόρο με max δόση 12,5 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και για αφίδες με max δόση 20 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Μηδική: Για αφίδες με δόση 7,5-10 γρ. σκευάσμα / στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 50 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί καλύψεως με την έναρξη της προσβολής.

Καλλωπιστικά: Για αφίδες με max δόση 25 γρ. σκευάσμα / στρέμμα, για αλευρώδεις και για Δευτερεύουσα δράση κατά του θρίπα με δόση 35-40 γρ. σκευάσμα / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.

Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

- Τομάτες (Θ): **2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες.**
- Πεπόνι (Υ): **2 εφαρμογές ανά 25 ημέρες.**
- Εσπεριδοειδή (Φυτώρια), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδι), Κεράσια, Δαμασκηνιά, Τομάτες (Υ), Μελιτζάνες (Υ, Θ), Πιπεριές (Υ), Αγγούρι (Θ), Βαμβάκι, Καπνός, Πατάτα, Μηδική, Καλλωπιστικά: **2 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες.**
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γρέιπ φρουτ, Κίτρι), Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινα, Νεκταρινιά): **1 εφαρμογή.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
2. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης της. ***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμιά στο βαμβάκι. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος.***

Διαχείριση της ανθεκτικότητας

- Να χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επιβλαβών στο ελάχιστο.
- Να αποφεύγετε τη χρήση του PROFIL 20 SG σε καλλιέργειες που έχουν ψεκασθεί με άλλα νεονικωτινοειδή σκευάσματα καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που σκευάσματα αυτής της κατηγορίας έχουν αποδοθεί αναποτελεσματικά.
- Να γίνεται εναλλαγή του PROFIL 20 SG με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από τα νεονικωτινοειδή.

Προληπτικά μέτρα για την προστασία των ωφέλιμων αρθρόποδων:

- Σε θερμοκήπια που γίνεται εφαρμογή του PROFIL 20 SG, η εξάπλωση βομβινών (για επικονίαση των ανθέων) ή/και αρπακτικών ακάρεων, να γίνεται μόνο μετά το στέγνωμα των φύλλων.
- Η εξάπλωση των υμενόπτερων παρασιτοειδών θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του PROFIL 20 SG.
- Η εξάπλωση των αρπακτικού Όνις θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του PROFIL 20 SG.
- Επιβάλλεται η διατήρηση αψέκαστης ζώνης δέντρων εσπεριδοειδών σε ποσοστό 5% για την προστασία του ωφέλιμου εντόμου **Cales noaki**.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

- Εγείστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
- Διαιλύστε την απαιτούμενη δόση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μικρή ποσότητα νερού.
- Ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανδευση.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Εφαπτά τον μεγάλο αριθμό των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών καλλωπιστικών φυτών συνιστάται πριν τον ψεκασμό της καλλιέργειας να γίνει δοκιμή σε μικρή έκταση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

- Ροδάκινα, Νεκταρινιά: **30 ημέρες.**
- Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κίτρι, Μήλα, Αχλάδια, Κεράσια, Δαμασκηνιά, Βαμβάκι, Καπνός, Μηδική, Τομάτες (Θ), Κολοκυνθοειδή (με μη-εδώδιμο φλοιό): Πεπόνι (Υ): **14 ημέρες.**
- Τομάτες (Υ), Πιπεριές (Υ), Μελιτζάνες (Υ), Κολοκυνθοειδή (με εδώδιμο φλοιό): Αγγούρι (Θ), Πατάτες: **7 ημέρες.**
- Μελιτζάνες (Θ): **3 ημέρες.**