

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου στα μηλοειδή και του βοτρυτή σε αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια). Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλαστική κίνηση και διελασματική δράση. Παρεμποδίζει την βιοσύνθεση των αμινοξέων, αναστέλλοντας την επιμήκυνση του μυκηλίου και την διείσδυση του στην φυλλική επιφάνεια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μηλιά: Για **Φουζικλάδιο** (*Venturia inaequalis*), με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 75-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών.

Αχλαδιά: Για **Φουζικλάδιο** (*Venturia pyrina*) και για **Καστανή κηλίδωση** (*Stemphium vesicarium*), με δόση 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (μέγιστο 75 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 75-150 λίτρα/στρ. Εφαρμογές από την πράσινη κορυφή έως το στάδιο μικρών καρπών.

Αμπέλι (Οινοποίηση σταφύλια): Για **Βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*), με δόση 75-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (75-125 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το κλείσιμο έως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών.

Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια): Για **Βοτρυτή** (*Botrytis cinerea*), με δόση 75-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (75-125 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου από το κλείσιμο έως την αλλαγή του χρώματος των σταφυλιών.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): **2 εφαρμογές ανά 7-8 ημέρες**

Αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): **2 εφαρμογές ανά 7-20 ημέρες**

Παρατηρήσεις:

Για την αποφυγή της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με QUALY να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις ανιλνοπυριμιδίνες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

- 1) Οι δόσεις ανά εκατό λίτρα νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.
- 2) Στα Μηλοειδή να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μυκητοκτόνο επαφής.
- 3) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προεidoποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρεις (2-3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα μυκητοκτόνα MERPAN 80 WG και BUMPER 25 EC.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά, Αχλαδιά: 60 ημέρες.

Αμπέλι (οινοποίηση σταφύλια): 21 ημέρες.

Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): 7 ημέρες.



QUALY® 300 EC

Cyprodinil 30 %
Ομάδα ανιλνοπυριμιδινών
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Cyprodinil: 30 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 69,8 % β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του φουζικλάδιου στα μηλοειδή και του βοτρυτή σε αμπέλι (οινοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια)

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 - Περιέχει Cyprodinil μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60.399/16-1-2014.

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,
25 St.-Peter-Strasse,
A-4021 Linz, Αυστρία

Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:
1 λίτρο e

Nufarm
Grow a better tomorrow

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (καπέλο, γάντια και ολόσωμη φόρμα) κατά την εφαρμογή. Φοράτε κατάλληλα γάντια σε περίπτωση εργασιών σε καλλιέργεια όπου εφαρμόστηκε το σκευάσμα».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από την υποθερμία. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μη προκαλέσετε εμετό, χορηγήστε ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα εάν ο ασθενής είναι αναίσθητος. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν λερωθεί και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** για όλες τις καλλιέργειες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

Διαχείριση της ανθεκτικότητας:

Το QUALY δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με μυκητοκτόνα των εξής ομάδων: βενζιμιδαζολικά, καρβαμιδικά, δικαρβοξυμιδικά, ιμιδαζολικά, τριαζόλες, στρομπιλουρίνες, μορφολίνες και κινολίνες. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζονται μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλνοπυριμιδινών πάνω από 4 φορές στην ίδια καλλιέργεια και την ίδια καλλιεργητική περίοδο. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτ. προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τρίπλο ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Ημερομηνία παραγωγής: Βλέπε επί
Αριθμός παρτίδας: της συσκευασίας



0219

0219