

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα χρησιμοποιήσετε. • ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατίψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα και τη μη γεωργική γη. Για να προστατίψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση/ καταστροφή του SAMSON Extra 60D, πρέπει να γίνεται σε υψικόμμο που έχει κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνθήκες θερμοκρασίας.

HM/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη



0217



SAMSON® EXTRA

6 OD

Nicosulfuron
(ομάδα πυριμιδινυλοσουλφονουρίας)

Εγγυημένη σύνθεση:

nicosulfuron 6% β/ο
βοηθητικές ουσίες 93,4% β/β

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 λίτρο

Κάτοχος της έγκρισης:

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park - De Kleetlaan 12B, Bus 9, Diegem B-1831, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.Π.Ε.Θ.,

T.Θ. 48, 570 22, Σίνδος · Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70012/ 21-1-2013

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.

Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξεινολακτικού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αραβοσίτος

ΣΤΟΧΟΣ:

Αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Σετάρια (*Setaria spp.*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*).

Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήθα (*Amaranthus spp.*), Τάτουλας (*Datura stramonium*).

ΔΟΣΗ: 75 κ.εκ./στρέμμα.

ΟΚΛΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

-Για μουχρίτσα και σετάριας από τα 2 φύλλα έως το αδελφωμα.

-Για βέλιουρα από τα 2-6 φύλλα έως το αδελφωμα.

-Για πλατύφυλλα ζιζάνια στα 2-6 φύλλα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

Παρατηρήσεις:

- 1) Οι εφαρμογές γίνονται στα 2-8 φύλλα της καλλιέργειας του αραβοσίτου.
- 2) Όταν έχουμε σταδιακή εμφάνιση των ζιζανίων στο χρόνο, συνιστάται 2 εφαρμογές σε μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, ως εξής: 1η εφαρμογή με δόση 50 κ.εκ/στρέμμα και 2η εφαρμογή με δόση 25 κ.εκ/στρέμμα.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος, με πίεση μικρότερη από 2,5Atm (40psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπλεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθορισμός ψεκαστικού: Ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα. Αν δε γίνει αυτό ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3% (1 λίτρο ανά εκατάλιτρο) μέχρις ότου απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Τα στάβια καθαρισμού τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

-Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού (αντλία, ψεκαστικό αυλό) και αδειάστε ξανά.

- Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνίας οικιακής χρήσης 3% ανά 100λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος "ψεκάζοντας" υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να αδειάσει. Επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία (προσθέτοντας πάλι αμμωνία) άλλη μια φορά και ακόμη μία φορά χωρίς αμμωνία.

- Χρησιμοποιείστε το ίδιο διάλυμα για το ξέπλυμα δύο φορές των φίλτρων και των μπλεκ τα οποία ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.

Ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: •Να αποφεύγεται η χρήση ολοκλήρου του φυτού του αραβοσίτου ως ζωοτροφή, πριν την ωρίμανσή του. •Να μην πραγματοποιείται ψεκασμός εάν αναμένεται βροχή στις επόμενες 6 ώρες. •Μη ψεκάσετε όταν φυσάει και αντίθετα με την φορά του ανέμου. •Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και

σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το SAMSON EXTRA 6 OD, στον ίδιο αγρό την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβοσίτος.

σποράς ή φύτευσης των καλλιεργιών που ακολουθούν: Για σπορά χειμερινού αταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του SAMSON EXTRA 6 OD και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. • της πρόσβασης του ανθρώπου στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Είσοδος του εργάτη στην καλλιέργεια αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβοσίτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 10°C.

Κατά την 1^η - 2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκό καλαμπόκι καθώς και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σπορά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: -