

Αερόλυμα (ΑΕ)

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
60418/ 29-04-2014

Εγγυημένη σύνθεση: Imazalil: 2% β/β
βοηθητικές ουσίες: 97.9% β/β

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο
με θεραπευτική δράση για τον έλεγχο
του Βοτρύτη και της Κομμίσωσης
στελέχους σε τομάτες θερμοκηπίου**



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.
- Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υπόπνο για πρόκληση καρκίνου.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Περιεχόμενο: **300 κ.εκ.**

Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αριθμός παρτίδας:

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Scomid® Aerosol είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο και έχει θεραπευτική δράση για τον έλεγχο του Βοτρύτη και της Κομμίσωσης στελέχους σε τομάτες θερμοκηπίου.

Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C-14.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: για Βοτρύτη (*Botrytis cinerea*) και Κομμίσωση στελέχους (*Didymella lycopersicum*) με ψεκασμό του προϊόντος με στοχοθετημένο τρόπο για 0,5-1 sec από απόσταση 10-15 cm. Εφαρμογή όταν έχουν ξυλοποιηθεί τα στελέχη και όταν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας είναι ορατά (ανοιχτές έως σκουρές καφέ κηλίδες προσβολής στους βλαστούς).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερπητική περίοδο: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες*.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 460 ανά στρέμμα καλλιέργειας και ανά χρήση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του προϊόντος με στοχοθετημένο τρόπο για 0,5-1 sec από απόσταση 10-15 cm σε προσβεβλημένους βλαστούς / στελέχη.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Ψεκασμός μεγαλύτερης διάρκειας ή πολύ κοντά μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα και νέκρωση. Μην αγγίζετε τα φύλλα ή τους καρπούς και μην εφαρμόζετε σε νέους μη ξυλοποιημένους βλαστούς, λόγω του κινδύνου εγκαυμάτων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Τομάτες (θερμοκηπίου): 0 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το προϊόν παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλικιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φυλάσσεται μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες. • Μην καπνίζετε. • Περιέκτης είναι υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. • Να αποφεύγεται η εξουβέρωση του στο περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακίδι εταφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συγχίστε για επλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω έκθεση.

Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Ποτέ μη χορηγείτε ο,τιδήποτε από το στόμα σε ανείσθητο άτομο.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS EUROPE B.V.

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ, Π.Π.Ε.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr



UN 1950

