



Targa[®] 5EC

Quizalofop-P-ethyl 5%

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Quizalofop-P-ethyl 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,5 % β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακόσμη.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ - ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα

Κάτοχος της άδειας: Nissan Chemical Europe S.A.S

Parc d'Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 St-Didier au Mont d'Or, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.- Agrifibz,

Ξενίας 1, 11527, Αθήνα, Τηλ.: 210 7471000

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος - Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός άδειας διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ) : 70191/12-12-2016

ZIZANIOKTONO



0220

160x135



Targa[®] 5EC

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μερισμάτων στα φύλλα και στο ριζώμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Λαχανικά (Καρότο, Τομάτο, Φασόλι με λαβή, Μπιέλι χωρίς λαβή),
Όσπρια (Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια), **Ελασιώδη Σπέρια** (Βαμβάκι, Σόγια),
Ποτότα, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ (Ζαχαρότευτλα) : Μία (1) μεταφωτρωτική εφαρμογή από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση, με εύρος δόσης 100-150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και από το στάδιο επιμήκυνσης του στέλεχους ως και στο φύλλο σημιαίας με δόση 150-300 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. **Ηλιανθος, Ελαιοκράμβη:** Μία (1) μεταφωτρωτική εφαρμογή από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση, με εύρος δόσης 100-150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και από το στάδιο επιμήκυνσης του στέλεχους ως και στο φύλλο σημιαίας με δόση 150κ.εκ. σκευάσμ./στρ. για τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτ./στρ.

Παρατηρήσεις:

Καταπολεπούμενο ζιζάνιο σε προφωτρωτική εφαρμογή:
Ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides* (Αλεπονουρά), *Avena* sp. (Αγριοβόλιμη), *Bromus* sp. (Βρόμος), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli*, *Echinochloa phylloragosa* (Μουχρίτσα), *Hordeum vulgare* (Κριθάρι), *Lolium* sp. (Ηρεσ), *Oryza rufipogon*, *Phalaris* sp. (Φαλαριδες), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum aestivum* (Σιτάρι), Πολυετή ζιζάνια: *Agoropyron repens* (Αγρόπυρο), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ριζώμα).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Ετήσια ζιζάνια: *Setaria* sp. (Σετάρια), *Poa annua* (ετήσια Πόα), Πολυετή ζιζάνια: *Cynodon dactylon* (Αγριάδα).

Ανεκτήσιμα ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα

1. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.
2. Χρόνος εφαρμογής:
Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20-30 εκατοστά και 125 εκ. / στρέμμα για τα αναβλαστήσει.
Η *Poa annua* καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα
3. Μη ψεκάσετε τον Ηλιανθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων.
4. Μη ψεκάσετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
5. Μη ψεκάσετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία σφύρου στα φύλλα.
6. Κατά την εφαρμογή του Targa 5 EC σε καλλιέργειες φασολιών, μπιελιών και ηλιανθού, να μην αναμειγνύεται με λαβή ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 1 εφαρμογή

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με προτεινόμενη πίεση τουλάχιστον 2 bar.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα ¾ με νερό και προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος και υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού:

Αδειάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού, αφαιρέστε τα φίλτρα και τα μπεκ, καθαρίστε τα και ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό τρεις φορές, Γεμίστε με καθαρό νερό το 10% του ψεκαστικού δοχείου και θέστε σε λειτουργία το σύστημα καθαρισμού εφόσον υπάρχει. Κυκλοφορήστε το νερό μέσα από την αντλία και τα άλλα μέρη για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αδειάστε το ψεκαστικό και επαναλάβετε τη διαδικασία, αδειάζοντας το νερό πλήρως περνώντας το από την αντλία, τα λάστιχα και τους αιολούς. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού χρησιμοποιώντας τον ελαστικό σφραγιστή γυαλιού νερού. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα και μπεκ. Τα νερά του ξεπλύνματος από κάθε στάδιο πρέπει να συλλέγονται, και να ψεκάονται στο ακρο του αγρού που έγινε η εφαρμογή, ή να διατίθενται με ασφάλεια.

Συνδυαστικότητα:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολειστεί:
- Φυλάξτε το χωριτά από γεωργικά φάρμακα, λίπασμα και σπύρους. Χρησιμοποιήστε χωριτά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανόκτονα. - Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. - Μη ψεκάσετε όταν φυσάει. - Μη διπλοψεκάσετε τα ακρα των ζωνών. - Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. Μη χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του Targa 5 EC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευάσμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας:

- Η μέγιστη δόση στον ηλιανθο θα πρέπει να είναι 150 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
- Στις καλλιέργειες φασόλια με λαβή και μπιέλια χωρίς λαβή ενδέχεται να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Γι' αυτό συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) : Καρότο, Τομάτο, Φασόλι με λαβή, Μπιέλι χωρίς λαβή: 21, Ζαχαρότευτλα : 60, Όσπρια (Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια), Ηλιανθος, Πατάτα, Βαμβάκι: 45, Ελαιοκράμβη, Σόγια : 90.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε την ελευθέρωση στα περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμνή ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτιμώμενου με τους τοπικούς κανονισμούς.

Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και ολόσμη φόρμα και γάντια κατά την εφαρμογή.

Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμεινούν, καλέστε ιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Κρατήστε τον παθόντα σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ιατρό. **Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα:** Κανένα σύμπτωμα δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστό. **Αντιδοτό:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία (απομάλισμα – παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη από μια γουλιού, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέακτη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέακτη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις προβλεπόμενες χρήσεις είναι \geq 400 κ.εκ./στρέμμα και 5 μέτρων από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις προβλεπόμενες χρήσεις είναι $<$ 400 κ.εκ./στρέμμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύνμα (τα νερά του ξεπλύνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρίψιμο, αναποθετούνται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης-χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύστε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, προστατευμένο από το ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες 0-30°C. Μην αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Στις συνθήκες αυτές το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

HM/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε επί της συσκευασίας



0220

160x135