

TEBU-MAX 20EW



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η προστασία στο **MAXimum**

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με βάση τη δραστική ουσία **tebuconazole** (20%) με **προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση** σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs, FRAC Group 3).

- ▶ Υψηλή αποτελεσματικότητα.
- ▶ Ευρύ φάσμα δράσης.
- ▶ Αξιόπιστη λύση.
- ▶ Μη φυτοτοξικό για την καλλιέργεια εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.



TEBU-MAX 20EW

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ/κή περίοδο	ΡΗΙ (ημέρες)
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.	κ.εκ./στρ.			
Μηλιά, Αχλαδιά	Φουζικλάδιο, Ωίδιο	50 - 90	75-150	90	Από την πράσινη κορυφή και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Κέντρων των γεωργικών προειδοποιήσεων.	1	14
Αχλαδιά	Καστανή Κηλίδωση						
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηινιά, Κερασιά	Ωίδιο, Μονιλία ανθέων και καρπών	90	75-150	140	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμανση των καρπών και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Κέντρων των γεωργικών προειδοποιήσεων.	1	7
Ελιά	Κυκλοκόνιο		75-125	50-75	Εφαρμογή την άνοιξη και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	1	Δ.Ε.
Αμπέλι	Ωίδιο		40-100	50	Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	3 ανά 14 ημέρες	14
Σκόρδο	Σκωρίαση		25 - 100	125	Εφαρμογή άνοιξη-καλοκαίρι και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	1	21
Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ)	Ωίδιο		40 - 100	125	Εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	1	3
Σιτάρι, Κριθάρι	Σεπτοριάσεις, Σκωριάσεις		25-60	125	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.	2 ανά 14 ημέρες	28
Σπαράγγι	Σκωρίαση		100	125	Εφαρμογές μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	2 ανά 14 ημέρες	6 μήνες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Παρατηρήσεις: 1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, οι δόσεις ανά 100 λίτ.νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η δόση στο στρέμμα. 2. Στο σκόρδο να γίνεται μια εφαρμογή ανά 3 έτη. 3. Να μην γίνονται εφαρμογές το φθινόπωρο στο σκόρδο.

TEBU-MAX® 20 EW	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	60518/ 28-03-2016
Δραστική ουσία	Tebuconazole 20% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
ΠΡΟΣΟΧΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Υποίπιο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Περιέχει Propionic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester & Rosin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
<p>ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ</p> <p>Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>	



Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co. KG

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, Φαξ, 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ, 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr



K&N Efthymiadis



ΜΑΡΤΙΟΣ 2019