K&NE EARTH MATTERS

TEPPEKI 50 WG

flonicamid (χημική ομάδα πυριδινοκαρβοξαμιδίων)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: Flonicamid 50% β/β
Βοηθ. ουσίες 47,92% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**
- **Περιέχει Disodium maleate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**
- **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **75 γρ.**

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, Βι.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiads.gr

Κάτοχος της άδειας, παρασκευαστής σκευάσματος:
ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.,
Pegasus Park, De Kleetlaan 12 b, Box 9 1831 Diegem, Βέλγιο

ISK

Αριθ.Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14511 / 29-5-2015

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Πλύνετε τα χέρια, βραχίονες και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. •Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτωσης. •Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. •Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα. •Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα. •Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό. •Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού. •Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφεύχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων.
Η δράση του ενοποίεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Επλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υπογιφεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Εππλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα ρούχα ξαναφορέστε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 779 3777

Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΕΣ

1221

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιές, Μανταρινιές, Λεμονιές, Γκρέπ – φρουτ, Κιτριά, Φράπες, Νεραντζιές, Περγαμόντο,: Για **αφίδες εσπεριδοειδών** (*Aphis citricola, Toxoptera auranti, Aphis gossypii, Myzus persicae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 10γρ./στρέμμα ή 3,5-10γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιές: Για **αφίδες** (*Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Κερασιές: Για **αφίδες** (*Myzus cerasi, Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi, Hyalopterus pruni*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Δαμασκηνιές: Για **αφίδες** (*Hyalopterus pruni, Myzus persicae, Brachycaudus helichrysi, Brachycaudus schwartzi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών[1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΜΗΛΙΕΣ: Για **κρίζα αφίδα** (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Eriosoma lanigerum*) και για **πράσινη αφίδα** (*Aphis pomi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα.
ΑΧΛΑΔΙΕΣ, ΚΥΔΩΝΙΕΣ, NASHI: Για **αφίδες, γκρίζα αφίδα της αχλαδιάς** (*Dysaphis pyri, Eriosomla lanigerum*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών[1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτες, Μελιτζάνες (αγρού): Για **αφίδες** (*Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosphium euphobiae, Macrosphium sp., Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Τομάτες, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου): Για **αφίδες** (*Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosphium euphobiae, Macrosphium sp., Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Ιδιαίτερα στα θερμοκηπίο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 Φυλλώματος, 2 Με στάγδην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Τομάτες, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου) (για εφαρμογές με στάγδην άρδευση): Για **Αλευρώδεις** (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*). Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σ΄ αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι μια 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος. Δόση: 16γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 max (1 Φυλλώματος, 2 Με στάγδην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 μέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 200-500 λίτρα/στρέμμα.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια (θερμοκηπίου): Για **αφίδες** (*Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosphium euphobiae, Macrosphium sp., Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΣΙΤΑΡΙ: Για **αφίδες** (*Aphis nasturtii, Macrosiphum avenae, Macrosiphum dirhodum, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΠΝΟΣ: Για **αφίδες** (*Myzus sp.*) και για **θρίπες** (*Thrips tabaci*) [4] (Χρήση ήρσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών[1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΠΝΟΣ: (εφαρμογή με ριζοπότισμα το νερό της μεταφύτευσης) [4]: Για **Αφίδες** (*Myzus nicotianae, Myzus sp., Aphis sp.).* και για **θρίπες** (*Thrips tabaci*) [4] (Χρήση ήρσσονος σημασίας). Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών[1]. Δόση: 14 γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 max (1 εφαρμογή με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος) με μεσοδιάστημα 14 μέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-60 λίτρα/στρέμμα.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για **αφίδες** (*Aphis gossypii*) και για **Λύγκο** (*Lygus sp.)*[4](Χρήση ήρσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 7,5γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 7-14 μέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα.
ΑΡΑΚΑΣ (με λοβό) υπαίθρου [6]: Για **Αφίδες** (*Myzus persicae, Aphis fabae*) (Χρήση ήρσσονος σημασίας). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο του 6ου ξεδιπλωμένου φύλλου χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 35-70 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ (αγρού και θερμοκηπίου): Για **αφίδες** (*Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών εντόμων [1]. Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 μέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ: Για **αφίδες** (*Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aphis fabae*). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών [1]. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.

Παρατηρήσεις:
1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4) Για τις χρήσεις ήρσσονος σημασίας του Βαμβακιού και του Καπνού, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες του αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
5) Για τη χρήση ήρσσονος σημασίας του Αρακά (με λοβό), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες του αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμού καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγειάς ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόπολων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. -Επεμβάσεις με TEPPEKI νωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα. -Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας. -Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με TEPPEKI. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωπή ανθεκτικότητα με το flonicamid. -Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που προϋπάρχουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξπλένονται από πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 60 ημέρες. Μηλιές, Αχλάδιες, Κυδωνιές, Nashi: 21 ημέρες. Ροδακινιές, Δαμασκηνιές, Κερασιές, Αρακάς (με λοβό): 14 ημέρες. Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια (θερμοκηπίου), Τομάτες, Μελιτζάνες (αγρού και θερμοκηπίου): 1 ημέρα. Καπνός: 7 ημέρες. Σπάρι: 28 ημέρες. Βαμβάκι: 75 ημέρες.