



Valis Plus

WG

Valifenalate + copper oxychloride + copper hydroxide
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου.

Εγγυημένη σύνθεση:

Valifenalate 6% β/β
(χημική ομάδα valinamide carbamates)
Copper oxychloride 15% β/β σε Cu
Copper hydroxide 15% β/β σε Cu
Βοηθητικές ουσίες 41.38% β/β
UFI: KW11-Y0W4-600E-5Q3V



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: **1 κιλό**

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60722 / 23-11-2018

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου. Μίγμα δυο μυκητοκτόνων: του Valifenalate - νέο διασυστηματικό μυκητοκτόνο με διελασματική δράση, αναστέλλει τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων και του χαλκού, σε μορφή Copper oxychloride και Copper hydroxide, προστατευτικά μυκητοκτόνα επαφής με δράση σε πολλαπλά σημεία (multi-site mechanism of action).

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (σε γραμμάρια σκευάσματος) – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποίηση σταφύλια): Περονόσπορος. **Δόση:** max. 200 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 200 γραμ.). Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, από την αρχή της βλάστησης ως την αλλαγή του χρώματος των καρπών. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100 λίτρα.
Τομάτα Υπαίθρου, Βιομηχανική Τομάτα, Πατάτα: Περονόσπορος. **Δόση:** max. 250 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 250 γραμ.). Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100 λίτρα.
Κρεμμύδι: Περονόσπορος. **Δόση:** max. 250 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 250 γραμ.). Κάνετε εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. **Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 20-100 λίτρα.

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση της προσβολής.
2. Σε περίπτωση μεγάλης πίεσης προσβολής, εφαρμόστε το σκεύασμα σύμφωνα με το μικρότερο μεσοδιάστημα εφαρμογών.
3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
4. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανία και Κορινθιακή σταφίδα από τη χρήση του σκευάσματος.
5. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε σιγά σιγά τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος της εφαρμογής.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Επαναλάβετε δύο φορές.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνεται εναλλαγή εφαρμογών, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (Οινοποίηση και Επιτραπέζια σταφύλια): **28 ημέρες**
Βιομηχανική τομάτα: **10 ημέρες**
Πατάτα: **7 ημέρες**
Τομάτα Υπαίθρου, Κρεμμύδι: **3 ημέρες**



Valis Plus

WG

Valifenalate + copper oxychloride + copper hydroxide
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου.

Εγγυημένη σύνθεση:

Valifenalate 6% β/β
(χημική ομάδα valinamide carbamates)
Copper oxychloride 15% β/β σε Cu
Copper hydroxide 15% β/β σε Cu
Βοηθητικές ουσίες 41.38% β/β
UFI: KW11-Y0W4-600E-5Q3V



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Ύποπτο καρκινογένεσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: **1 κιλό**

Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60722 / 23-11-2018

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Γενικά: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης: - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. - Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. - Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. - Σε περίπτωση επαπεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

Μη ρυπαίνεται τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους οργανισμούς στο έδαφος μην χρησιμοποιείτε αυτό η οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει χαλκό, σε ετήσια συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από 400 γραμ. χαλκό/στρ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ζώνη ανάσχεσης:

- **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, για την καλλιέργεια του αμπελιού.
- **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα με φυτική κάλυψη, για τις καλλιέργειες της τομάτας, βιομηχανικής τομάτας, πατάτας, και του κρεμμυδιού.

UFI: KW11-Y0W4-600E-5Q3V

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα νέα συσκευασίας (σασκούλες) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

5 200252 691505 >



0124