



Valis<sup>F</sup>

WG

Valifenalate + Folpet  
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι.

Εγγυημένη σύνθεση:  
Valifenalate 6 % β/β  
(χημική ομάδα valinamide carbamates)  
Folpet 48 % β/β  
(χημική ομάδα φθαλιμιδίων)  
Βοηθητικές ουσίες 42,8 % β/β  
UFI: VQ11-Y0HA-K00F-U0XR

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
- Υποπτο καρκινογένεσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει folpet. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: **1 κιλό**

Κάτοχος της άδειας:  
CERTIS BELCHIM B.V.,  
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,  
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60969/ 15-06-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι. Μίγμα δυο μυκητοκτόνων: του Valifenalate, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με διελασματική δράση που αναστέλλει τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων και του Folpet προστατευτικού μυκητοκτόνου επαφής με δράση σε πολλαπλά σημεία (multi-site mechanism of action) των μυκήτων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (σε γραμμάρια σκευάσματος) – ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια): Περονόσπορος. Δόση: max. 200 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 200 γραμ.). Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έκπτυξη του 5ου φύλλου και επαναλαμβάνονται εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, έως την αλλαγή του χρώματος των καρπών. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 10-100 λίτρα.

Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): Περονόσπορος. Δόση: max. 200 γραμ. ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστη δόση ανά στρέμμα 200 γραμ.). Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έκπτυξη του 5ου φύλλου και επαναλαμβάνονται εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 10-100 λίτρα.

Παρατηρήσεις:  
Εφαρμόστε το προϊόν προληπτικά ή στην αρχή της προσβολής, πριν η ασθένεια προσβάλει τη νέα βλάστηση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φυτά.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες:

- Valifenalate, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 40(H5) κατά FRAC και

- Folpet, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα M04 κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: - Συνιστάται η χρήση του προληπτικά όταν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από την ασθένεια.

- Συνιστάται η χρήση του σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης μυκήτων (π.χ. φυτοϋγειονομικά μέτρα, κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.), όπου αυτό είναι δυνατό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα σταφύλια): 28 ημέρες  
Αμπέλι (Επιτραπέζια σταφύλια): Καθορίζεται από το στάδιο εφαρμογής (τελευταία εφαρμογή στο τέλος της άνθησης)



Valis<sup>F</sup>

WG

Valifenalate + Folpet  
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι.

Εγγυημένη σύνθεση:  
Valifenalate 6 % β/β  
(χημική ομάδα valinamide carbamates)  
Folpet 48 % β/β  
(χημική ομάδα φθαλιμιδίων)  
Βοηθητικές ουσίες 42,8 % β/β  
UFI: VQ11-Y0HA-K00F-U0XR

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
- Υποπτο καρκινογένεσης.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει folpet. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Καθαρό βάρος: **1 κιλό**

Κάτοχος της άδειας:  
CERTIS BELCHIM B.V.,  
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,  
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ: 2310 56 86 56, E-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60969/ 15-06-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης η πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Δηλώσεις προφύλαξης: - Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. -Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. - Αποφεύγετε να αντανέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμού/εκνεφώματα. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή». «Σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια».

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μία αφέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

UFI: VQ11-Y0HA-K00F-U0XR

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγούμενης για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) μαζί με τα κουτιά καταστρέφονται με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



Ημερομηνία παραγωγής/  
Αριθμός παρτίδας:



0124