

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Targa[®] 5EC

Υψηλή
ταχύτητα
δράσης

Σταθερή αξία ενάντια
σε δυσεξόντωτα ζιζάνια



Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων με βάση το quizalofop-p-ethyl (5% β/ο). Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.



Targa® 5EC


ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Targa® σε βιοχημικό επίπεδο αναστέλλει τη δράση της καρβοξυλάσης του ακετυλο-συνεζύμου A (ACCCase), ένζυμο απαραίτητο για τη βιοσύνθεση των λιπιδίων (**HRAC Group 1**). Αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η απώλεια της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών και τελικά ο θάνατος των ζιζανίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο	PHI (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα			
ΒΑΜΒΑΚΙ	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Αιματόχορτο, Αλεπονουρά, Βέλιουρας από σπόρο, Βρώμος, Ήρες, Μουχρίτσα, Κριθάρια, Φαλαρίδες, Σιτάρια Μετρίως ευαίσθητα: Σετάριας, Ετήσια Πόα	100-150 (για ετήσια)	20-40	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας ως την έναρξη της κάλυψης των σειρών (BBCH 12-31).	1	45
		150-300 (για πολυετή)				
ΗΛΙΑΝΘΟΣ	Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα: Αγρόπυρο, Βέλιουρας από ρίζωμα Μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα	100-150 (για ετήσια)				
		150 (για πολυετή)				
ΜΗΔΙΚΗ	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Αιματόχορτο, Αλεπονουρά, Βέλιουρας από σπόρο, Βρώμος, Ήρες, Μουχρίτσα, Κριθάρια, Φαλαρίδες, Σιτάρια Μετρίως ευαίσθητα: Σετάριας, Ετήσια Πόα	100-150	Σε νεοσπαρθείσα μηδική είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη (BBCH 11-49).			

Παρατηρήσεις: 1. Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. 2. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας. 3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο. 4. Ο Βέλιουρας καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100κ.εκ./στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20-30 εκ. και 125κ.εκ./στρέμμα για τις αναβλαστήσεις. 5. Η Ετήσια Πόα καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300κ.εκ./στρέμμα. 6. Μην ψεκάζετε τον ηλιάνθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων. 7. Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός, όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες και όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα. 8. Κατά την εφαρμογή του Targa 5 EC σε καλλιέργεια ηλιάνθου, να μην αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.

TARGA® 5 EC	
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)	70191 / 12-12-2016
Δραστική ουσία	Quizalofop-P-ethyl 5% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 	<ul style="list-style-type: none"> - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. - Περιέχει: Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (CAS: 64742-94-5), Calcium dodecylbenzenesulphonate (CAS: 26264-06-2) / 2-Ethylhexanol (CAS: 104-76-7), Dodecan-1-ol, ethoxylated (CAS: 9002-92-0). - Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Κάτοχος της άδειας: Nissan Chemical Europe SAS, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά/Διανομέας: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr



Καλλιεργούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

www.efthymiadis.gr



K&N Efthymiadis

