

ZIZANIOKTONO



CREDIT[®]
XTREME

η **ΝΕΑ**
ΓΕΝΙΑ
στα
σκευάσματα
GLYPHOSATE






CREDIT®

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το CREDIT® XTREME 540 SL είναι διασυστηματικό, καθολικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων) και υδροχαρών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων.

Το CREDIT® XTREME είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Nufarm που ενσωματώνει την **πατενταρισμένη τεχνολογία Dual Salt (DST)**, παρέχοντας στον παραγωγό μία πρωτοποριακή σύνθεση δύο αλάτων glyphosate υψηλής συγκέντρωσης.



Dual Salt Technology

Η τεχνολογία Dual Salt συνδυάζει την αξιοπιστία του άλατος **ισοπροπυλαμίνης (IPA)** με τα **πλεονεκτήματα του άλατος Καλίου**, συμπεριλαμβανομένων: της **ταχύτερης απορρόφησης** από τα ζιζάνια, της **καλύτερης αντοχής στην έκπλυση** από τη βροχή και της **βελτιωμένης αποτελεσματικότητας** υπό **δυσμενείς καιρικές συνθήκες**.

Άλατα ισοπροπυλαμίνης (IPA)

Τα σκευάσματα glyphosate που περιέχουν άλατα ισοπροπυλαμίνης είναι αξιόπιστα σκευάσματα με καλά χαρακτηριστικά ανάμιξης και χειρισμού.

Άλατα Καλίου


Τα άλατα Καλίου παρέχουν καλύτερη αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή και βελτιωμένη απόδοση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συγκριτικά με τα άλατα IPA.

Μίγμα Αλάτων

Τα **πιο εξελιγμένα σκευάσματα glyphosate περιέχουν μίγμα αλάτων**. Αυτοί οι **πατενταρισμένοι συνδυασμοί** παρέχουν **βελτιωμένη απόδοση και ευελιξία, καλύτερη συμβατότητα ανάμιξης και αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή**.

XTREME

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DUAL SALT




Επιπλέον, το **CREDIT® XTREME** εμπειρεύει ένα ειδικά σχεδιασμένο πακέτο επιφανειοδραστικών ουσιών υψηλής ποιότητας που, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dual Salt, προσφέρουν στον παραγωγό ένα προηγμένο σκεύασμα glyphosate με πολλαπλά οφέλη:

- ✓ Αυξημένη αποτελεσματικότητα σε ευρύ φάσμα ζιζανίων λόγω της ύπαρξης των διαφορετικών αλάτων.
- ✓ Ταχύτερη απορρόφηση από τα ζιζάνια και εξαιρετική μετακίνηση μέσα σε αυτά, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη καταστροφή τους (burn-down).
- ✓ Αποτελεσματικός ψεκασμός ακόμα και αν η εφαρμογή γίνει λίγο πριν ή μετά τη βροχή.
- ✓ Υψηλότερη συγκέντρωση glyphosate ανά σκεύασμα (ψεκασμός περισσότερων στρεμμάτων με τον ίδιο όγκο σκευάσματος, αγορά λιγότερων συσκευασιών για ευκολότερο χειρισμό, λιγότερες κενές συσκευασίες προς ανακύκλωση μετά τη χρήση).
- ✓ Βελτιωμένη διάλυση του προϊόντος στο νερό (ακόμα και σε πιο σκληρό νερό).
- ✓ Μειωμένη παραγωγή αφρού κατά το γέμισμα του βυτίου.
- ✓ Βελτιωμένη συνδυαστικότητα με άλλα ζιζανιοκτόνα στο βυτίο.
- ✓ Σταθερότητα του ιξώδους ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες (δε γίνεται παχύρρευστο και δύσχρηστο σε χαμηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης).



CREDIT[®] XTREME



50% περισσότερο glyphosate
συγκριτικά με το πρότυπο
(54% έναντι 36%)



Υψηλή συνδυαστικότητα
με άλλα ζιζανιοκτόνα
στο βυτίο



Ταχύτερη δράση



Εξαιρετική αποτελεσματικότητα
ακόμα και στα πιο
δυσεξόντωτα ζιζάνια



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Όλες οι γραμμικές καλλιέργειες (1) μετά τη συγκομιδή (Αγροί την άνοιξη και το φθινόπωρο)	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-400	--	10-40	Ψεκασμός προσπαρτικά των καλλιεργειών για την προετοιμασία του εδάφους.	1 εφαρμογή
	Ετήσια ζιζάνια (*)	100-200	--	10-40	Ψεκασμός των ζιζανίων που έχουν εμφανιστεί στον αγρό, μετασπαρτικά/ προφυτρωτικά των καλλιεργειών.	1 εφαρμογή
Καλαμιές των καλλιεργειών: Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Σπέλτα, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Αραβόσιτος	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-400	--	10-40	Ψεκασμός καλαμιών μετά τη συγκομιδή.	1 εφαρμογή
Δενδρώδεις καλλιέργειες (2) ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ-φρουτ, Κιτριά ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά, Κουκουναριά ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερυκοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά ΕΛΙΕΣ (3) ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	Ετήσια ζιζάνια (*)	100-266	--	10-40	Ψεκασμός μεταφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια κάτω από τα δένδρα ή σε λωρίδες την άνοιξη-νωρίς το καλοκαίρι.	2/28 ημέρες
					Ψεκασμός με ψεκαστήρα πλάτης μεταφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια κάτω από τα δένδρα ή σε λωρίδες την άνοιξη-νωρίς το καλοκαίρι.	2/28 ημέρες
Αμπέλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	Ετήσια ζιζάνια (*)	100-266	--	10-40	Ψεκασμός μεταφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια (στις γραμμές ή μεταξύ των γραμμών) την άνοιξη-νωρίς το καλοκαίρι.	2/28 ημέρες
Λιβάδια, γκαζόν (για καταστροφή ή ανανέωση της καλλιέργειας πριν την σορά).	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-400	--	10-40	Ψεκασμός κατά τη βλαστική ανάπτυξη των ζιζανίων και πριν από τη σορά.	1 εφαρμογή
Ακαλλιέργητες εκτάσεις	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	100-333	--	10-40	Ψεκασμός κατά τη βλαστική ανάπτυξη (άνοιξη με φθινόπωρο).	1 εφαρμογή
Φυτώρια δενδρυλλίων (δασικών, ανθοκομικών, κωνοφόρων)	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	500	--	20	Ψεκασμός κατά την περίοδο ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι εφαρμογές γίνονται μεταξύ των γραμμών με χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτρών) (Μάιος- Σεπτέμβριος).	1 εφαρμογή
	Ετήσια ζιζάνια (*)	200	--	20	Ψεκασμός κατά την περίοδο που σταματά η ανάπτυξη των ζιζανίων (Σεπτέμβριος- Νοέμβριος).	1 εφαρμογή
	Ετήσια ζιζάνια (*) Πολυετή ζιζάνια (**)	665	--	--	Ψεκασμός με ειδικό σχοινοδιαβρέκτη φερόμενο στο χέρι ή προσαρμοσμένο σε τρακτέρ. Για ζιζάνια υψηλότερα από το ύψος της καλλιέργειας, κατά την περίοδο ανάπτυξης των ζιζανίων (Μάιο-Σεπτέμβριο).	1 εφαρμογή ανά μεμονωμένο φυτό / ζιζάνιο
Κατά μήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών (6)	Ετήσια ζιζάνια (*)	267	--	--	Κοντά στην περίοδο βλάστησης των ζιζανίων.	1 εφαρμογή

Παρατηρήσεις: 1. Οι χρήσεις για όλες τις καλλιέργειες αφορούν στην προετοιμασία του εδάφους ή για χρήση μετασπαρτικά / προφυτρωτικά στις γραμμικές καλλιέργειες συμπεριλαμβανόντας: **κονδυλώδη και βολβώδη λαχανικά, λαχανικά με στέλεχος, όσπρια, ελαιούχα φυτά (βυμβάκι, ηλίανθο, ελαιοκράμβη), πατάτα, σιτηρά και τεύτλα.** Το PHI καλύπτεται από το χρόνο μεταξύ της εφαρμογής και της συγκομιδής. 2. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος, αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το 3ο έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 4. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα. 6. Η εφαρμογή κατά μήκος των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια. Απαιτείται διάστημα 7 ημερών μετά την εφαρμογή για το γέμισμα των καναλιών. 7. Για την αγριάδα, η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30cm. 8. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεδίπλωμα της κορυφής. 9. Να μη γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 10. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 11. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 12. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. 13. Χρησιμοποιήστε υλικά ή γεωργικές πρακτικές για να αποφύγετε την επαφή των φρούτων με τη δραστική ουσία ή με το έδαφος που έχει υποστεί εφαρμογή με τη δραστική ουσία. 14. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δενδρώδεις καλλιέργειες: 7 ημέρες. Υπόλοιπα: δεν ορίζεται.

*Καταπολεμούμενα ετήσια ζιζάνια:

με δόση έως 266 κ.εκ./στρ.: Βρώμος, Λεπτή Ήρα, Μουχρίτσα, Λουβουδιά, Σκαρολάχανο.

επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 333 κ.εκ./στρ. (μόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των πλατύφυλλων ζιζανίων) και για τα επόμενα στάδια, με δόση έως 400 κ.εκ./στρ.: Μολόχες, Τσουκνίδες, Πολυκόμποι, Αντράκλα.

επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 500 κ.εκ./στρ.: Βελονίδα μαλακοειδής, Δωδεκάνθι, Κοινή Πόα

επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 665 κ.εκ./στρ.: Κεχροσετάρια, Γεράνι, Μαργαρίτα, Καλεντούλα, Καφέλλα.

**Καταπολεμούμενα πολυετή ζιζάνια:

με δόση έως 333 κ.εκ./στρ.: Φτέρη, Ξυλώδεις θάμνοι: Βάτα.


επιπλέον των παραπάνω, με δόση έως 665 κ.εκ./στρ.: Περικοκλάδα, Βέλγουρας, Αγριάδα, Οξαλίδα, Ραδίκι, Αγριοράδιο, *Diploaxis virgata*.




CREDIT® XTREME

η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ στα σκευάσματα GLYPHOSATE



	CREDIT® XTREME 540 SL
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):	70409 / 12.01.2021
Δραστικές ουσίες:	Glyphosate: 54% β/ο (υπό μορφή άλατος Ισοπροπυλαμίνης 40,08% β/ο και άλατος Καλίου 29,77% β/ο)
Μορφή σκευάματος:	Πυκνό Διάλυμα (SL)
	<ul style="list-style-type: none">- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν αιτήματος.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777	

Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρία



Καθαριερχούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής. Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

www.efthymiadis.gr



K&N Efthymiadis