Cayunis®

1L e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 61041/08.06.2021

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: bixafen 7,5% β/ο, spiroxamine 15% β/ο, trifloxystrobin 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 67,37% β/β

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

με δράση εναντίον του Ωιδίου, της Σεπτορίωσης, της Δικτυωτής Κηλίδωσης και της Ρυγχοσπορίωσης των Σιτηρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: P0T0-F0MJ-S001-A7N5

GROUP 7 | 5 | 11 FUNGIDES

Κάτοχος της Έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, Τ.Κ.151 23, Τηλ: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

Διανομέας:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ., Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Β΄ Είσοδος, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Τηλ.: 2310 568656, info@efthymiadis.gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή. • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (μάτια) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει spiroxamine and trifloxystrobin.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην αναπνέετε αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. • Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και την αναπνοή κατά την ανάμιξη/ φόρτωση. • Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:
- φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων, στο χειμερινό σιτάρι, στο χειμερινό κριθάρι και στη χειμερινή σίκαλη.
- αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων μαζί με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%, στο ανοιξιάτικο σιτάρι, στο ανοιξιάτικο κριθάρι και στην ανοιξιάτικη σίκαλη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων/ γιατρό. • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. • Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/ γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Χρειάζεται ειδική αγωγή. • Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις δύο (2) πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρ' όλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

UFI: P0T0-F0MJ-S001-A7N5

ΚΑΓΙΟΥΝΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Το σκεύασμα είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση εναντίον του ωιδίου, της σεπτορίωσης, της δικτυωτής κηλίδωσης και της ρυγχοσπορίωσης των σιτηρών. Είναι μίγμα τριών (3) δραστικών ουσιών (δ.ο.) με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης μεταξύ τους. Η δ.ο. bixafen σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II–παρεμποδιστής SDH). Η δ.ο. spiroxamine παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης (SBI class II) με τρόπο διαφορετικό από εκείνη των DMIs. Είναι διασυστηματική μυκητοκτόνος ουσία με προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Η δ.ο. trifloxystrobin είναι συνθετική ουσία, παράγωγη των φυσικών στρομπιλουρινών με διελασματική δράση. Εμφανίζει κυρίως προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή των μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου III του κυτοχρώματος bc 1 (Ομάδα QoIs, υποομάδα oximinoacetates).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε τα 2/3 του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ορατά υπολείμματα του προϊόντος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΣΤΟΧΟΣ–ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ) - (M.A.E/M.E.):
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ: Ωίδιο *Blumeria graminis (Erysiphe graminis),* **Σεπτορίωση** *Zymoseptoria tritici (Septoria tritici)*, **Καστανή Σκωρίαση** *Puccinia recondita*, **Κίτρινη σκωρίαση** *Puccinia striiformis,* **Σκωρίαση** *Puccinia triticina*. Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 30-59). **Δόση**: 80-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα/στρέμμα. **M.A.E/M.E:**1-2/ 21.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: Ωίδιο *Blumeria graminis f. sp. hordei (Erysiphe graminis f. sp. Hordei),* **Δικτυωτή κηλίδωση** *Pyrenophora teres,* **Ρυγχοσπορίωση** *Rhynchosporium secalis*. Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 30-59). **Δόση**: 80-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα/στρέμμα. **M.A.E/M.E:** 1-2/ 21.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: Ρυγχοσπορίωση *Rhynchosporium secalis*, **Δικτυωτή κηλίδωση** *Pyrenophora teres*. Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 30-59). **Δόση**: 80-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα/στρέμμα. **M.A.E/M.E:** 1-2/ 21.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΙΚΑΛΗ, ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΣΙΚΑΛΗ: Ωίδιο *Blumeria graminis (Erysiphe graminis)*. Εφαρμογές από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι πριν την άνθηση (BBCH 30-59). **Δόση**: 80-100 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 20-40 λίτρα/στρέμμα. **M.A.E/M.E:** 1-2/ 21.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη: Μη εφαρμόσιμο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **bixafen**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 7** κατά FRAC. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **spiroxamine**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 5** κατά FRAC. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **trifloxystrobin**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 11** κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ–ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός.

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.

Cayunis®

1L e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΥΑΑΤ): 61041/08.06.2021

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: bixafen 7,5% β/ο, spiroxamine 15% β/ο, trifloxystrobin 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 67,37% β/β

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

με δράση εναντίον του Ωιδίου, της Σεπτορίωσης, της Δικτυωτής Κηλίδωσης και της Ρυγχοσπορίωσης των Σιτηρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: P0T0-F0MJ-S001-A7N5

GROUP 7 | 5 | 11 FUNGIDES

Κάτοχος της Έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, Τ.Κ.151 23, Τηλ: 210 6166000,
www.cropscience.bayer.gr

Διανομέας:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ., Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Β΄ Είσοδος, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Τηλ.: 2310 568656, info@efthymiadis.gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.