

AGREE WP

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφιών λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

ΘΑΞΙΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΩΗ (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Γκρέιν-φρουτ, Κιτριά): για Ανδοτήρη στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200-400 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Θα ακολουθήσουν οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ: για Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κήμινες, Υπονομιετές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογεννητιών νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγιδιών φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΦΟΥΤΟΥΚΙΑ: για Φυλλοδέστες και Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογεννητιών νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγιδιών φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για Φυλλοδέστες, Καρακάφα, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-200γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή στην αρχή της άνθησης με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή με τη χρήση φερομονικών παγιδιών ανίχνευσης πληθυσμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, να γίνουν ψεκασμοί ανά 7 ημέρες για 3 εβδομάδες και να ακολουθούν 3 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 3 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: για Ανάσκη, Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κήμινες, Υπονομιετές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογεννητιών νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγιδιών φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: για Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κήμινες, Υπονομιετές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογεννητιών νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγιδιών φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινολογία σταφύλια): για Ευθεμίδα, Καγκυλίδες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-200γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή στην αρχή της άνθησης με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φυσιολογικά στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) Ένας ψεκασμός κατά τη γονιμοποίηση των ανθέων, β) Ένας ψεκασμός κατά την άνθηση, γ) Ένας ψεκασμός όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού, δ) Ένας ψεκασμός με την αλλαγή χρώματος των ραγών. Να γίνουν ψεκασμοί ανά 7 ημέρες για 3 εβδομάδες και να ακολουθούν 3 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 3 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3.

ΕΛΙΑ: για Πυρρηνίτη (ανόθη γενιά), Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Ψεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εάν δεν υπάρχουν, τότε ακολουθούμε το ακόλουθο: - Ένας ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. - Ένας ψεκασμός μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. - Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός προνυμφών. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΦΡΑΥΛΙΑ: για Πράσινο ακουλίκι, Σποντότετρα, Φυλλοφάγες κήμινες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150 γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΑΜΠΑΙ (Υ.Θ.): για Πράσινο ακουλίκι, Σποντότετρα, Κήμινες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ.Θ.): για Μομέστρα, Σποντότετρα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κήμινες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΜΠΡΟΚΟΛΙ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΟΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ: για Μομέστρα, Σποντότετρα, Πιερίδα, Σκόρος των λαχανικών, Προνύμφες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΜΑΡΟΥΛΙ κ.α. σαλματικά (σκόροδο, κάρδοσο, φύλλα και βλαστοί του είδους brassica), ΡΟΚΑ, ΣΠΑΝΑΚΙ, ΣΕΚΟΥΛΑ, ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ, ΑΝΗΘΟΣ, ΜΑΡΑΘΟ, ΣΕΛΙΝΟ, ΣΕΛΕΡΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Υ.Θ.): για Μομέστρα, Σποντότετρα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κήμινες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΠΡΑΣΟ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ: για Μομέστρα, Προνύμφες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 80-150 γρ./σπρέιμα με 100-150 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεογεννητιών νεαρών προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ: για Φθορημία, Μομέστρα, Σποντότετρα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κήμινες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 200 γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΒΑΜΒΑΚΙ: για Πράσινο ακουλίκι, Ρόδινο ακουλίκι, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 60-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη μετά από 7-10 μέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 3.

AGREE WP

ΑΡΑΒΟΤΙΣΣΕ: για Πυρρηνίδα, Πράσινο ακουλίκι, Σέζαμια, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 80-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Επανάληψη μετά από 7-10 μέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΚΑΠΝΟΣ: για Πράσινο ακουλίκι, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 60-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-120 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Πρώτος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δεύτερος και τρίτος ψεκασμός αν χρειασθεί σε διάστημα 7-10 ημερών. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ(Υ.Θ) (Τουλίνες, Φρέζες, Λίλιουμ, Γαργαλλο, Ζέρμπερες, Τριαντάφυλλα): για Μομέστρα, Σποντότετρα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κήμινες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογεννίτες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΔΑΙΣΚΑ ΔΕΝΔΡΑ (Πεύκο, Βελανιδιά): για Πιτυοκάμψη, Λυμάντρια, Υφάντρια Μαλακόσσωμα στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 300-500 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Για Πιτυοκάμψη ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο. Για Λυμάντρια ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο-Μάιο. Για Υφάντρια, Μαλακόσσωμα ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο-Ιούνιο. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: για Εφθυσία στη δόση 100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός της επιφάνειας των αποθηκών. Αριθμός εφαρμογών: 1.

Παρατηρήσεις:

- Ψεκάζετε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες (πρώτου και δεύτερου σταδίου) και παρατηρήσετε οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρητθεί χαμηλά.
- Οι εφαρμογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφευχθεί η υψηλή UV ακτινοβολία.
- Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί το σκεύασμα δρα δια κατάποσης.
- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
- Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών από ψεκασμό, τότε ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναληφθεί.
- Η χρήση του σκευάσματος ενδείκνυται στη βιολογική γεωργία και μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Ειδικά για την ευθεμίδα και καγκυλίδες στο αμπέλι, ο ψεκασμός γίνεται στην ζώνη των ταξιμίων.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

Διακρίση Ανθεκτικότητας: Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Ειδικά φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.



AGREE WP

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση:

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain

GC-91: 50% β/β ή 25.000 iu/mg,

σε ενεργό πρωτεΐνη δ-endotoxin 3,8% β/β

βοηθητικές ουσίες: 50% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

«Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν»

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 200 γραμ.

Κάτοχος της έγκρισης:

MITSUMI AgriScience International S.A./N.V.,

Avenue de Tervueren 270, B-1150 Brussels, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14582/ 20-12-2016

AGREE WP

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεκρίζοντας την αναδύση. Μην αφήσετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 12 ώρες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προσηγομένως με σκόνη για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΔΙΑΔΕΙΞΕΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:

•Μακριά από παιδιά. Φυλάσσετε κλειδωμένο. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνεύετε τη σκόνη. •Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικό ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά, μάσκα (για εφαρμογές σε θερμοκήπια) και ολόσωμο φόρμα κατά την αμειψι/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. •Περίεξε Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση. •Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΦΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε το μολυσμένο ενδύματα πριν τα ξεκαθαρίσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό σε θερμοκρασία < 30° C, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Η/μ/ν παρασκευής:
Αριθμός παρτίδας:

