

AGREE WP

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά): για Ανθοτρήτη στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200-400 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ: για Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογόνων των νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΦΥΝΤΟΥΚΙΑ: για Φυλλοδέστες και Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογόνων των νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για Φυλλοδέστες, Καρπόκαφα, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-200γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή στην αρχή της άνησης με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή με τη χρήση φερομονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσμού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, να γίνονται ψεκασμοί ανά 7 ημέρες για 3 εβδομάδες και να ακολουθούν 3 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 3 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: για Ανάσση, Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογόνων των νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΙΝΙΑ: για Φυλλοδέστες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογόνων των νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινολογίσια σταφύλια): για Ευθεμίδα, Κογκυλίδα, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-200γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή στην αρχή της άνησης με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς σύμφωνα με τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τη φαινολογική στάδια της καλλιέργειας και συγκεκριμένα: α) Ένας ψεκασμός στην αρχή της άνησης, β) Ένας ψεκασμός κατά τη γονιμοποίηση των ανθέων, γ) Ένας ψεκασμός όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιτζελιού, δ) Ένας ψεκασμός με την αλλαγή χρώματος των ραγών. Να γίνονται ψεκασμοί ανά 7 ημέρες για 3 εβδομάδες και να ακολουθούν 3 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 3 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3.

ΕΛΙΑ: για Πυρηνοτρήτη (ανθόβια γενιά), Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Ψεκασμοί με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εάν δεν υπάρχουν, τότε ακολουθούμε το ακόλουθο: - Ένας ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. - Ένας ψεκασμός μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. - Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός προνυμφών. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΦΡΑΥΔΑ: για Πράσινο ακουλίκι, Σποντόπτερα, Φυλλοφάγες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150 γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΜΠΑΜΙΑ (Υ.Θ): για Πράσινο ακουλίκι, Σποντόπτερα, Κάμπιες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ.Θ): για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ: για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πιερίδα, Ξκόρας των λαχανικών, Προνύμφες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΜΑΡΟΥΛΙ κ.α. σαλατικά (σκόρολα, κάρδαμο, φύλλα και βλαστοί του είδους brassica), ΡΟΚΑ, ΣΠΑΝΑΚΙ, ΤΣΙΚΟΥΛΑ, ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ, ΑΝΗΘΟΣ, ΜΑΡΑΘΟ, ΣΕΛΙΝΟ, ΣΕΛΕΡΙ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Υ.Θ): για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΠΡΑΣΟ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ: για Μαμέστρα, Προνύμφες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 80-150 γρ./σπρέιμα με 100-150 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Ένας ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των νεογόνων των νεαρών προνυμφών. Επόμενος ψεκασμός εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες.

ΠΑΤΑΤΑ: για Φθοριμία, Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 200 γρ./σπρέιμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΒΑΜΒΑΚΙ: για Πράσινο ακουλίκι, Ρόδινο ακουλίκι, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 60-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη ανά 7-10 μέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 3.

AGREE WP

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: για Πυραλίδα, Πράσινο ακουλίκι, Σεζόμια, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 80-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Επανάληψη ανά 7-10 μέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΚΑΠΝΟΣ: για Πράσινο ακουλίκι, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 60-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-120 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Πρώτος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δεύτερος και τρίτος ψεκασμός αν χρειασθεί σε διάστημα 7-10 ημερών. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΗΣΤΙΚΑ(Υ.Θ) (Τουλίπες, Φρέζες, Λίλιουμ, Γαρύφαλλα, Ζέρμπερες, Τριαντάφυλλα): για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο ακουλίκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης, μόλις εμφανιστούν οι νεογόνες προνύμφες, ανά 7 ημέρες για 4 εβδομάδες και ακολουθούν 4 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ (Πεύκο, Βελανιδιά): για Πιτυκόκαμψη, Λυμάντρια, Υφάντρια Μαλακόσωμα στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 300-500 λίτρα ψεκαστικό υγρό/σπρέιμα, Για Πιτυκόκαμψη ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο. Για Λυμάντρια ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο-Μάιο. Για Υφάντρια, Μαλακόσωμα ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο-Ιούνιο. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: για Εφέσση στη δόση 100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού. Ψεκασμός της επιφάνειας των αποθηκών. Αριθμός εφαρμογών: 1.

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες (πρώτου και δεύτερου σταδίου) και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλό.
2. Οι εφαρμογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφευχθεί η υψηλή UV ακτινοβολία.
3. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί το σκεύασμα δρα δια κατάποσης.
4. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
5. Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών από ψεκασμό, τότε ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναληφθεί.
6. Η χρήση του σκευάσματος εγδνεκνται στη βιολογική γεωργία και μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. Ειδικά για την ευθεμίδα και καγκυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός γίνεται στην ζώνη των τασιμίων.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

Διακρίση Ανθεκτικότητας: Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.



AGREE WP

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση:

Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain

GC-91: 50% β/β ή 25.000 iu/mg,

σε ενεργό πρωτεΐνη δ-endotoxin 3,8% β/β

βοηθητικές ουσίες: 50% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: **500 γραμ.**

Κάτοχος της έγκρισης:

MITSUI AgriScience International S.A./N.V.,

Avenue de Tervueren 270, B-1150 Brussels, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος

Τηλ.: 2310-568656 – e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14582/ 20-12-2016

AGREE WP

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέστε το πυκνό διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για πάνω από 12 ώρες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνεύτε τη σκόνη. •Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. •Να φοράτε προστατευτικό γάντι/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά, μάσκα (για εφαρμογές σε θερμοκήπιο) και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. •Περιέχει Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση. •Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους: εφόσον είναι εύκολο.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό σε θερμοκρασία < 30° C, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Ημ/νία παρασκευής: Βλέπε στην επιφάνεια του κουτιού
Αριθμός παρτίδας:

