

AZATIN 2,6EC

azadirachtin A

(χημική ομάδα: εκχύλισμα από τους σπόρους του τροπικού φυτού δέντρου του Νημ (Neem), με επιστημονική ονομασία Azadirachta indica)

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: azadirachtin A 2,6% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 77,11% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει azadirachtin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας:

MITSUI AgriScience International S.A./N.V.

Avenue de Tervueren 270 B-1150, Brussels, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:

K&N EΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος | Τηλ.: 2310 568656 | e-mail: info@eftthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14617 / 30-06-2017

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο επαφής και στόμαχου με διασυστηματική δράση. Η δραστική του ουσία είναι εκχύλισμα από τους σπόρους του τροπικού φυτού (Azadirachta indica) δέντρου του Νημ (Neem tree). Δρα παρεμβαίνοντας στην εξέλιξη απλών σταδίων των εντόμων. Παράλληλα, παρεμποδίζει την σύνθεση εκδυσόνης (ορμόνη που ελέγχει την έκδυση). Έχει επίσης αντιπροφικές και απωθητικές ιδιότητες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το μίγμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και υπό συνεχή αναδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με πολύ όξινα ή αλκαλικά σκευάσματα.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αφού στεγνώσει το σκεύασμα.

Στοιχεία φωτοτοξικότητας: Δεν είναι φωτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελειωτά επιμέτρηση πριν τη συγκομιδή:

- Μηλιά, Αμπέλι, Καρότο, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Αγρού), Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα, Λάχανο, Πατάτα: **3 ημέρες**
- Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Μανταρινιά), Φράουλα (Α & Θ), Κουνουπίδι, Μαρούλι και λοιπά σαλατικά, αντίδι, ρόκα, Σκαρόλες (πικρίδα), σπανάκι, φύλλα παντζαριού, σέσκουλα, μαϊντανός, βασιλικός: **7 ημέρες**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας φέρονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος θα ρίχνουμε στο ψεκαστικό νερό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακίνηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβατη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες < 54°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 1 χρόνο από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μακριά από παιδιά. •Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα αποφυγής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά ενδύματα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. •Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Χρησιμοποιείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

• Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

• Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

30 μέτρων σε Μηλιά.

20 μέτρων, με φυτική κάλυψη, σε Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Φράουλα, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Μαρούλι και λοιπά σαλατικά, Αντίδι, Ρόκα, Σκαρόλες (πικρίδα), Σπανάκι, φύλλα παντζαριού, Σέσκουλα, Μαϊντανός, Βασιλικός, Λάχανο, Κουνουπίδι, Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά.

10 μέτρων, με φυτική κάλυψη σε Πατάτα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθα, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα.

• Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αμέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη.

Σε Εσπεριδοειδή και Μηλοειδή: 10 μέτρων, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%. Δεν απαιτείται αμέκαστη ζώνη προστασίας εφόσον ο ψεκασμός γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%.

Σε Αμπέλι, Καλλωπιστικά και Ανθοκομικά: 5 μέτρων. Δεν απαιτείται αμέκαστη ζώνη προστασίας εφόσον ο ψεκασμός γίνεται με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

"Διαβάστε στην πίσω σελίδα πριν από τη χρήση"

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε στο

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: άνω μέρος της συσκευασίας.



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Γκρέιπ-Φρουτ, Μανταρινιά Κλημεντίνες): Για Φυλλοκνίστη (Phylloxera citrella), Κοκκοειδή (Cecidomyia sinensis, Aonidiella aurantii), Αφίδες (Aphis spp., Myzus spp., Toxoptera spp.), Αλευρώδης (Parabemisia myricae, Trialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus), Τζιτζικιάκια (Empoasca spp., Metcalfa spp.) και Θρίπτες (Scirtothrips spp., Selenothrips spp., Heliothrips spp., Pezothrips spp.) με δόση 75-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (75-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Μηλιά: Για Αφίδες (Dysaphis plantaginea, Aphis spp., Myzus spp., Eriosoma spp.), Φυλλορύκτες-Νάρκη (Phylloxera spp., Leucophaea malifolia, Lyonetia dekerella) και Τζιτζικιάκια (Stictocerca spp.) με δόση 100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής, αρχίζοντας από το στάδιο της ρόδινης κορυφής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Αμπέλι (ονοτοποίηση και επιτραπέζια σταφύλια): Για Τζιτζικιάκια (Empoasca spp., Metcalfa spp.), Κοκκοειδή (Scaphoideus titanus), Θρίπτες (Drepanothrips reuteri, Thrips spp.) και Κογγυλίδες (Spartanopsis pilleriana) με δόση 120-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Φράουλα (Αγρού και Θερμοκηπίου): Για Θρίπτες (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci), Αφίδες (Pentatrichopus fragaefolii, Aphis sp.), Προνύμφες Λεπιδοπτερίων - Noctuidae (Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp.) και Αλευρώδη (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) με δόση 120-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Καρότο: Για Προνύμφες Λεπιδοπτερίων - Noctuidae (Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp., Mamestra spp., Plutella sp.), Μύγα του καρότου (Psila rosae) και Αφίδες (Aphis sp., Aulacothum solani, Dysaphis sp., Myzus persicae) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Τομάτα, Μελιτζάνα (Αγρού και Θερμοκηπίου), Πιπεριά (Αγρού): Για Θρίπτες (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci), Αλευρώδης (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), Λυριόμυζα (Lyriomyza spp.), Προνύμφες Λεπιδοπτερίων - Noctuidae (Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp.), Tuta absoluta, Αφίδες (Aphis spp., Myzus persicae) και Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου): 3-5 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες. Για Τομάτα, Μελιτζάνα (Αγρού): 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες. Για Πιπεριά (Αγρού): 4-5 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα (Αγρού και Θερμοκηπίου): Για Θρίπτες (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci), Αλευρώδης (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), Λυριόμυζα (Lyriomyza spp.), Προνύμφες Λεπιδοπτερίων - Noctuidae (Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp.), Αφίδες (Aphis spp., A. gossypii) και Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3-5 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Λάχανο, Κουνουπίδι: Για Προνύμφες Λεπιδοπτερίων (Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp.) και Αφίδες (Aphis spp.) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Μαρούλι, Αντίδι, Ρόκα, Σκαρόλες (πικρίδα), Σπανάκι, Φύλλα παντζαριού, Σέσκουλα, Μαϊντανός, Βασιλικός (Αγρού και Θερμοκηπίου): Για Αφίδες (Nesonovia ribisnigra, Aphis spp., Myzus persicae, Macrosiphum sp.), Προνύμφες Λεπιδοπτερίων (Trichoplusia ni, Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp.), Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) και Λυριόμυζα (Lyriomyza spp.) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Πατάτα: Για Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), Αφίδες (Aphis spp.) και Προνύμφες Λεπιδοπτερίων (Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp.) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Καλλωπιστικά - Ανθοκομικά (Αγρού και Θερμοκηπίου): Για Λυριόμυζα (Lyriomyza spp.), Αφίδες (Aphis spp., Myzus persicae), Θρίπτες (Frankliniella occidentalis, Thrips spp.), Προνύμφες Λεπιδοπτερίων (Heliothis spp., Spodoptera spp., Earias spp., Lymantria dispar, Tortrix viridana, Thaumetopoea pythicalpa), Αλευρώδης (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) και Τζιτζικιάκια (Empoasca spp., Metcalfa spp.) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρ. Ψεκάσμοι με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 5 εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

Φοινικοειδή: Για *Rhynchophorus ferrugineus* (Αντίδι) με δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. α) Ψεκάσμος κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου. β) Ψεκάσμος κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής. γ) Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκάσμο κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια, τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκάσμος κάλυψης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Έχει δευτερευόντα δράση κατά των ακάρεων.
2. Να εφαρμόζεται νωρίς, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των εντόμων.
3. Να εφαρμόζεται κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας (κατά προτίμηση αργά το απόγευμα).
4. Σε περίπτωση βροχής εντός 8 ωρών από την εφαρμογή συνιστάται επανάληψη του ψεκάσμου.
5. Σε καλλωπιστικά και ανθοκομικά φυτά, συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή μικρής έκτασης.
6. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Ειδικά στα φοινικοειδή:

1. Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενότητων.
2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή. Μην το εφαρμόζετε σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτωμάτων αφίδων στην περιοχή εφαρμογής. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
3. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκάσμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο.
4. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.
5. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερονιόμων παγιδιών, αυτά να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών.