

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υγρή φόρμουλα Ασβεστίου υψηλής συγκέντρωσης.
- Αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα Ασβεστίου, Μαγγανίου και Ψευδάργυρου ως φυσικά σύμπλοκα πολυπεπτιδών.
- Βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της αντοχής τους σε μετασυλλεκτικούς τραυματισμούς σε εφαρμογές πριν τη συγκομιδή.
- Εξαιρετική κάλυψη και απορροφητικότητα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
- Απόσια ανόργανου Αζώτου που θα μπορούσε να προκαλέσει όψιμες αναβλαστήσεις.
- Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
- Προσδίδει ιδανικό pH στο βυτίο (περίπου 4).

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Το προϊόν πρέπει να προστίθεται στο βυτίο του φεκαστικού συγχρόνως με το νερό και υπό συνεχή ανάδευση.
- Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εφαρμόστε με προσοχή τις οδηγίες και τις δόσεις του παρασκευαστή τους.
- Τα άλλα φυτοπροτατευτικά προϊόντα πρέπει να προστίθενται στο τέλος της διαδικασίας της ανάμιξης και αν χρειάζεται, προδιαλυμένα.
- Εφαρμόστε το φεκαστικό διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	%β/β	%β/ο
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του ασβεστίου	CaO	15,0
Υδατοδιαλυτό μαγγάνιο	Mn	0,5
Υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος	Zn	0,5

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Το **ΒΙΟΦΟΛ AMINOCAL** είναι μια ειδική φόρμουλα Ασβεστίου που περιέχει επίσης Μαγγάνιο και Ψευδάργυρο καθώς και φυσικά πολυπεπτίδια και αμινοξέα. Ο σχηματισμός πρωτεΐνικών συμπλόκων των πολυπεπτιδών με τα ιχνοστοιχεία που περιέχει, διευκολύνει την απορρόφηση τους από τα φυτά. Κατ' αυτό τον τρόπο επιτυχάνεται εξαιρετικός εφοδιασμός των φυτών με Ασβεστίο, τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς (νεαρούς ή ανεπτυγμένους).

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ**

**Μηλοειδή:** 400-500cc/στρ. 3-4 εφαρμογές, με έναρξη 3-5 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Η τελευταία εφαρμογή λίγο πριν τη συγκομιδή.

**Ροδακινιά, Νεκταρινιά:** 300-400cc/στρ. 1-3 εφαρμογές κοντά στη συγκομιδή.

**Δαμασκηνιά:** 300-400cc/στρ. 3-4 εφαρμογές ανά 30 ημέρες, με έναρξη μετά την άνθιση.

**Κερασιά:** 300-400cc/στρ. 3-5 εφαρμογές σε περιόδους υψηλής υγρασίας ή καταπόνησης.

**Απρέλι:** 300-400cc/στρ. 2-3 εφαρμογές, μαζί με τα μυκητοκτόνα από το μικρό καρπίδιο μέχρι την έναρξη μαλακώματος των καρπών.

**Εσπεριδοειδή:** 300-400cc/στρ. 2-3 εφαρμογές, κατά την περίοδο διόγκωσης των καρπών.

**Μαρούλι:** 400cc/στρ. 2-3 ή περισσότερες εφαρμογές, με έναρξη 2-3 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση.

**Λάχανο, Κουουνούπι:** 400cc/στρ. 2-3 ή περισσότερες εφαρμογές, με έναρξη λίγο πριν το σχηματισμό των κεφαλών.

**Τομάτα, Πιπεριά:** 300-400cc/στρ. Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές, με πρόσθια στο μικρό καρπίδιο.

**Κολοκυνθεοειδή:** 300-400cc/στρ. Εφαρμογές ανά 15 ημέρες αρχίζοντας από το δέσιμο των καρπών και μέχρι 10-15 μέρες πριν τη συγκομιδή.

**Φράουλα:** 400cc/στρ. 2-3 εφαρμογές μαζί με τα μυκητοκτόνα εναντίον του Βοτρύπτη.

**Ακτινίδιο:** 300-400cc/στρ. 3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια διόγκωσης των καρπών. Οι φεκασμοί πρέπει να αρχίσουν πριν χνουδίσουν οι καρποί.

**Λοιπές Καλλιέργειες:** 300-500cc/στρ. ή 200-500cc/100lt ψεκ. υγρού. Οι χαμηλές δόσεις χρησιμοποιούνται προληπτικά και σε ήπιες ελλείψεις Ασβεστίου, ενώ οι υψηλές θεραπευτικά. Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές ανά 7-10 ημέρες.

**Εφαρμόζεται με διαφυλλικό φεκασμό με όγκο φεκαστικού υγρού 100-150lt/στρ.**

**ANAKINEΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Παρασκευαστής: AGLUKON GERMANY  
Διανομή: K&N ΕΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.0.48, 570 22, Σίνδος  
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

